ЧЕБЫШЕВСКИЙ СБОРНИК

Том 17 Выпуск 2

УДК 519.4

О НОРМАЛИЗАТОРАХ В НЕКОТОРЫХ ГРУППАХ
КОКСТЕРА¹

И. В. Добрынина (Тула)

Аннотация

Пусть G — конечно порожденная группа Кокстера с копредставлением

$$G = \langle a_1, \dots, a_n; (a_i a_j)^{m_{ij}} = 1, i, j = \overline{1, n} \rangle,$$

где m_{ij} — элементы симметрической матрицы Кокстера: $\forall i, j \in \overline{1, n}, m_{ii} = 1, m_{ij} \geq 2, i \neq j$.

Если $m_{ij} \geq 3$ ($m_{ij} > 3$), $i \neq j$, то G называется группой Кокстера большого (экстра-большого) типа. Эти группы определены К. Аппелем и П. Шуппом.

Если группе G соответствует конечный дерево-граф Γ такой, что вершинам графа Γ соответствуют образующие $a_i, i = \overline{1, n}$, а всякому ребру e , соединяющему вершины с образующими a_i и a_j , соответствует соотношение $(a_i a_j)^{m_{ij}} = 1$, то мы имеем группу Кокстера с древесной структурой.

Группы Кокстера с древесной структурой введены В. Н. Безверхним, алгоритмические проблемы в них рассматривались В. Н. Безверхним и О. В. Инченко.

Группу G можно представить как древесное произведение двупорожденных групп Кокстера, объединенных по циклическим подгруппам. При этом от графа Γ группы G перейдем к графу $\bar{\Gamma}$ следующим образом: вершинам графа $\bar{\Gamma}$ поставим в соответствие группы Кокстера на двух образующих

$$G_{ij} = \langle a_i, a_j; a_i^2 = a_j^2 = 1, (a_i a_j)^{m_{ij}} = 1 \rangle$$

и

$$G_{jk} = \langle a_j, a_k; a_j^2 = a_k^2 = 1, (a_j a_k)^{m_{jk}} = 1 \rangle,$$

а всякому ребру $\bar{e}$, соединяющему вершины, соответствующие G_{ij} и G_{jk} — циклическую подгруппу $\langle a_j; a_j^2 = 1 \rangle$.

В настоящей работе доказывается, что нормализатор всякой конечно порожденной подгруппы H группы Кокстера с древесной структурой $\bar{G} = G_{ij} *_{\langle a_j; a_j^2 \rangle} G_{jk}$, где

$$G_{ij} = \langle a_i, a_j; a_i^2 = a_j^2 = 1, (a_i a_j)^{m_{ij}} = 1 \rangle$$

и

$$G_{jk} = \langle a_j, a_k; a_j^2 = a_k^2 = 1, (a_j a_k)^{m_{jk}} = 1 \rangle,$$

конечно порожден и существует алгоритм, выписывающий его образующие.

Ключевые слова: группы Кокстера, древесная структура, нормализатор, свободное произведение с объединением.

Библиография: 18 названий.

¹Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект 15-41-03222 р_центр_a).

ON NORMALIZERS IN SOME COXETER GROUPS

I. V. Dobrynina (Tula)

Abstract

Let G be a finitely generated Coxeter group with presentation

$$G = \langle a_1, \dots, a_n; (a_i a_j)^{m_{ij}} = 1, i, j = \overline{1, n} \rangle,$$

where m_{ij} — are the elements of the symmetric Coxeter matrix: $\forall i, j \in \overline{1, n}, m_{ii} = 1, m_{ij} \geq 2, i \neq j$.

If $m_{ij} \geq 3$ ($m_{ij} > 3$), $i \neq j$, then G is a Coxeter group of large (extra-large) type. These groups introduced by K. Appel and P. Schupp.

If the group G corresponds to a finite tree-graph Γ such that if the vertices of some edge e of the graph Γ correspond to generators a_i, a_j , then the edge e corresponds to the ratio of the species $(a_i a_j)^{m_{ij}} = 1$, then G is a Coxeter group with a tree-structure.

Coxeter groups with a tree-structure introduced by V. N. Bezverkhniy, algorithmic problems in them was considered by V. N. Bezverkhniy and O. V. Inchenko.

The group G can be represented as tree product 2-generated of Coxeter groups, amalgamated by cyclic subgroups. Thus from the graph Γ of G will move to the graph $\bar{\Gamma}$ in the following way: the vertices of the graph $\bar{\Gamma}$ we will put in line Coxeter group on two generators

$$G_{ij} = \langle a_i, a_j; a_i^2 = a_j^2 = 1, (a_i a_j)^{m_{ij}} = 1 \rangle$$

and

$$G_{jk} = \langle a_j, a_k; a_j^2 = a_k^2 = 1, (a_j a_k)^{m_{jk}} = 1 \rangle,$$

to every edge $\bar{e}$ joining the vertices corresponding to G_{ij} and G_{jk} is a cyclic subgroup

$$\langle a_j; a_j^2 = 1 \rangle.$$

In this paper we prove the following theorem: normalizer of finitely generated subgroup of Coxeter group with tree-structure

$$\bar{G} = G_{ij} *_{\langle a_j; a_j^2 \rangle} G_{jk},$$

$$G_{ij} = \langle a_i, a_j; a_i^2 = a_j^2 = 1, (a_i a_j)^{m_{ij}} = 1 \rangle,$$

$$G_{jk} = \langle a_j, a_k; a_j^2 = a_k^2 = 1, (a_j a_k)^{m_{jk}} = 1 \rangle$$

finitely generated and exist algorithm for generating.

Keywords: Coxeter group, tree-structure, normalizer, amalgamated product.

Bibliography: 18 titles.

1. Введение

Пусть G — конечно порожденная группа Кокстера с копредставлением

$$G = \langle a_1, \dots, a_n; (a_i a_j)^{m_{ij}} = 1, i, j = \overline{1, n} \rangle,$$

где m_{ij} — элементы симметрической матрицы Кокстера: $\forall i, j \in \overline{1, n}, m_{ii} = 1, m_{ij} \geq 2, i \neq j$ [1].

Группы Кокстера введены Х. С. М. Кокстером [2] в 1934 году. Понятие группы Кокстера возникло в теории дискретных групп, порождаемых отражениями относительно гиперплоскостей.

В 1983 году К. Аппелем и П. Шуппом определены классы групп Кокстера большого ($m_{ij} \geq 3, i \neq j$) и экстрабольшого ($m_{ij} > 3, i \neq j$) типов [3]. Ими рассмотрены проблемы

равенства и сопряженности слов в группах Кокстера экстрабольшого типа. Другие алгоритмические проблемы в группах Кокстера экстрабольшого типа рассматривались в работах [4], [5]. Ряд работ посвящен изучению алгоритмических проблем в группах Кокстера большого типа, например [6], [7].

Если группе G соответствует конечный дерево-граф Γ такой, что вершинам графа Γ соответствуют образующие $a_i, i = \overline{1, n}$, а всякому ребру e , соединяющему вершины с образующими a_i и a_j , соответствует соотношение $(a_i a_j)^{m_{ij}} = 1$, то мы имеем группу Кокстера с древесной структурой [8].

Группы Кокстера с древесной структурой введены В.Н. Безверхним в 2003 году, алгоритмические проблемы в них рассматривались В.Н. Безверхним и О.В. Инченко, например [8].

Группу G можно представить как древесное произведение двупорожденных групп Кокстера, объединенных по циклическим подгруппам. При этом от графа Γ группы G перейдем к графу $\bar{\Gamma}$ следующим образом: вершинам графа $\bar{\Gamma}$ поставим в соответствие группы Кокстера на двух образующих

$$G_{ij} = \langle a_i, a_j; a_i^2 = a_j^2 = 1, (a_i a_j)^{m_{ij}} = 1 \rangle$$

и

$$G_{jk} = \langle a_j, a_k; a_j^2 = a_k^2 = 1, (a_j a_k)^{m_{jk}} = 1 \rangle,$$

а всякому ребру $\bar{e}$, соединяющему вершины, соответствующие G_{ij} и G_{jk} — циклическую подгруппу $\langle a_j; a_j^2 = 1 \rangle$.

В группах кос нормализаторы подгрупп изучались автором в работе [9].

В настоящей работе доказывается, что нормализатор всякой конечно порожденной подгруппы H в свободном произведении $\bar{G} = G_{ij} *_{\langle a_j; a_j^2 \rangle} G_{jk}$ двупорожденных групп Кокстера G_{ij} и G_{jk} с древесной структурой, объединенных по циклической подгруппе $\langle a_j; a_j^2 = 1 \rangle$, конечно порожден и существует алгоритм, выписывающий его образующие.

2. Базовые понятия и утверждения

Пусть G — конечно порожденная группа Кокстера с древесной структурой, заданная представлением

$$G = \langle a_1, \dots, a_n; (a_i a_j)^{m_{ij}} = 1, i, j = \overline{1, n} \rangle,$$

где m_{ij} — число, соответствующее симметрической матрице Кокстера, причем $m_{ii} = 1, m_{ij} \geq 2, i \neq j$, группе G соответствует конечный связный дерево-граф Γ такой, что если вершинам некоторого ребра e графа Γ соответствуют образующие a_i и a_j , то ребру e соответствует соотношение вида $(a_i a_j)^{m_{ij}} = 1$.

ТЕОРЕМА 1. [10] Пусть группа $G = \langle \prod_{s=1}^n *G_s; \text{rel}G_1, \dots, \text{rel}G_n, \varphi_{ji}(U_{ij}) = U_{ji} \rangle$ есть древесное произведение групп, объединенных по изоморфным подгруппам $U_{ij} < G_i$ и $U_{ji} < G_j$ с помощью фиксированного набора изоморфизмов $\{\varphi_{ij}\} : \varphi_{ij}(U_{ij}) = U_{ji}$. Тогда если подгруппы U_{ij} и U_{ji} обладают условием максимальности и в сомножителях разрешимы 1) проблема вхождения; 2) проблема пересечения классов смежности любой конечно порожденной подгруппы $H < G_i$ с подгруппой $U_{ij} < G_i$; 3) существует алгоритм, выписывающий образующие пересечения любой конечно порожденной подгруппы $H < G_i$ с подгруппой $U_{ij} < G_i$, то в группе G разрешима проблема вхождения.

Группу Кокстера G с древесной структурой представим как древесное произведение двупорожденных групп Кокстера, объединенных по циклическим подгруппам: от графа Γ группы

G перейдем к графу $\bar{G}$ так, что вершинам графа $\bar{G}$ поставим в соответствие группы Кокстера на двух образующих

$$G_{ij} = \langle a_i, a_j; a_i^2 = a_j^2 = 1, (a_i a_j)^{m_{ij}} = 1 \rangle$$

и

$$G_{jk} = \langle a_j, a_k; a_j^2 = a_k^2 = 1, (a_j a_k)^{m_{jk}} = 1 \rangle,$$

а всякому ребру $\bar{e}$, соединяющему вершины, соответствующие G_{ij} и G_{jk} — циклическую подгруппу $\langle a_j; a_j^2 = 1 \rangle$.

СЛЕДСТВИЕ 1. *В группе Кокстера с древесной структурой разрешима проблема вхождения.*

Будем рассматривать свободное произведение $\bar{G}$ двупорожденных групп Кокстера

$$G_{ij} = \langle a_i, a_j; a_i^2, a_j^2, (a_i a_j)^{m_{ij}} \rangle$$

и

$$G_{jk} = \langle a_j, a_k; a_j^2, a_k^2, (a_j a_k)^{m_{jk}} \rangle$$

с древесной структурой, объединенных по циклической подгруппе $\langle a_j; a_j^2 \rangle$:

$$\bar{G} = \langle a_i, a_j, a'_j, a_k; a_i^2, a_j^2, a_k^2, a_j'^2, (a_i a_j)^{m_{ij}}, (a'_j a_k)^{m_{jk}}, a_j = a'_j \rangle.$$

Слово из группы $\bar{G}$ можно представить единственным образом в виде:

$$g = l_{1g} \dots l_{ng} K_g r_{ng} \dots r_{1g}, \quad (1)$$

где r_{tg} и l_{sg}^{-1} — представители правых классов смежности группы G_{ij} по $\langle a_j; a_j^2 \rangle$ и G_{jk} по $\langle a_j; a_j^2 \rangle$, причем r_{tg}, r_{t+1g} (аналогично l_{sg}, l_{s+1g}) принадлежат разным сомножителям группы $\bar{G}$. K_g — ядро слова g . Если K_g не принадлежит объединяемой подгруппе, то слоги l_{ng} и r_{ng} принадлежат одному сомножителю группы $\bar{G}$, а K_g — другому. В этом случае слоговая длина слова (1) равна $L(g) = 2n + 1$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. *Если в (1) $l_{1g} \dots l_{ng} = (r_{ng} \dots r_{1g})^{-1}$, то слово*

$$g = r_{1g} \dots r_{ng} K_g r_{ng}^{-1} \dots r_{1g}^{-1} \quad (2)$$

называется трансформой.

Если K_g принадлежит объединяемой подгруппе, то в (1) слоги принадлежат разным сомножителям группы $\bar{G}$. В этом случае слоговая длина слова

$$g = l_{1g} \dots l_{ng} h_g r_{ng} \dots r_{1g}, \quad (3)$$

где $h_g = K_g$, равна $L(g) = 2n$. Слово вида (1) будем называть нетрансформой нечетной длины, слово вида (3) нетрансформой четной длины.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. *Подслово $g = l_{1g} \dots l_{ng} (r_{ng} \dots r_{1g})$ называется левой (правой) половиной слов (1), (3). Подслово $l_{1g} \dots l_{ng} K_g$ ($K_g r_{ng} \dots r_{1g}$) — большим начальным (конечным) отрезком.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. *Левая (правая) половина слова*

$$w_i = l_{1w_i} \dots l_{mw_i} K_{w_i} r_{mw_i} \dots r_{1w_i}$$

называется изолированной в множестве $\{w_j\}_{j \in \overline{1, N}}$, если ни у одного из слов w_j^ε , $\varepsilon = \pm 1$, множества

$$(\{w_j\} \setminus w_i) \cup (\{w_j^{-1}\} \setminus w_i^{-1})$$

нельзя выделить $l_{1w_i} \dots l_{mw_i} (r_{mw_i} \dots r_{1w_i})$ в качестве начального (конечного) подслова, то есть $w_j^\varepsilon \neq l_{1w_i} \dots l_{mw_i} l_{m+1w_j} w_j^\varepsilon (w_j^\varepsilon \neq w_{j1}^\varepsilon r_{m+1w_j} r_{mw_i} \dots r_{1w_i})$.

Далее будем рассматривать специальное множество слов как в [11], [12].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. *Конечное множество слов $W = \{w_i\}_{i \in \overline{1, N}}$ группы $\overline{G}$ назовем специальным, если оно удовлетворяет следующим условиям:*

1. *Левая половина нетрансформы из множества W изолирована в нем. Если нетрансформа четной длины, то изолирована и левая, и правая половины.*

2. *Длину нетрансформы w_j нельзя уменьшить, умножая слева и справа на слова из подгруппы, порожденной множеством $\{w_i\} \setminus w_j$. Длину произвольного элемента w_j нельзя уменьшить, умножая на слово w длины меньше $L(w_j)$, принадлежащее подгруппе*

$$< \{w_i\}_{i \in \overline{1, N}} > .$$

3. *Если $w_i^\varepsilon = l_{1w_i'} \dots l_{nw_i'} K_{w_i'} r_{nw_i'} \dots r_{s+1w_i'} r_{sw_i'} \dots r_{1w_i'}$, $\varepsilon = \pm 1$, $s < n$, — нетрансформа из множества W и $\{w_i^{\eta\varepsilon} = l_{1w_i''} \dots l_{nw_i''} K_{w_i''} r_{nw_i''} \dots r_{s+1w_i''} r_{sw_i''} \dots r_{1w_i''}$, $\varepsilon = \pm 1\}$ — подмножество нетрансформ из $W \setminus \{w_i'\} \cup W \setminus \{w_i'^{-1}\}$, правые половины которых оканчиваются подсловом $r_{sw_i'} \dots r_{1w_i'}$, тогда если подгруппа $< w_i, i = \overline{1, n} > \cap r_{1w_i'}^{-1} \dots r_{sw_i'}^{-1} D r_{sw_i'} \dots r_{1w_i'} = B$, где $D = G_{ij}$, если $r_{s+1w_i'} \in G_{ij}$, либо $D = G_{jk}$, если $r_{s+1w_i'} \in G_{jk}$, то для $u \in B$ выполняются неравенства $L(w_i' u) \geq L(w_i')$, $L(w_i' u w_i^{\eta\varepsilon}) \geq L(w_i')$.*

4. *Пусть $w_i = l_{1w_i} \dots l_{sw_i} l_{s+1w_i} \dots l_{nw_i} K_{w_i} r_{nw_i} \dots r_{s+1w_i} r_{sw_i} \dots r_{1w_i}$, $w_j = l_{1w_j} \dots l_{sw_j} l_{s+1w_j} \dots l_{mw_j} K_{w_j} r_{mw_j} \dots r_{s+1w_j} r_{sw_j} \dots r_{1w_j}$ — слова из W , не обязательно различные, $s \leq m \leq n$, тогда не существует слова $g \neq 1$ длины меньше $2s$ из подгруппы, порожденной W , такого, что если $l_{1w_i} \dots l_{sw_i} \neq l_{1w_j} \dots l_{sw_j}$, то*

$$g w_i = l_{1w_j} \dots l_{sw_j} l'_{s+1w_i} \dots l'_{nw_i} K'_{w_i} r_{nw_i} \dots r_{1w_i},$$

либо если $r_{sw_i} \dots r_{1w_i} \neq r_{sw_j} \dots r_{1w_j}$, то

$$w_i g = l_{1w_i} \dots l_{nw_i} K'_{w_i} r'_{nw_i} \dots r'_{s+1w_i} r_{s+1w_j} r_{sw_j} \dots r_{1w_j},$$

либо если $r_{1w_i}^{-1} \dots r_{sw_i}^{-1} \neq l_{1w_j} \dots l_{sw_j}$, то

$$g w_i^{-1} = l_{1w_j} \dots l_{sw_j} r_{s+1w_i}^{\prime-1} \dots r_{nw_i}^{\prime-1} K_{w_i}^{\prime-1} l_{nw_i}^{-1} \dots l_{1w_i}^{-1},$$

либо если $l_{sw_i}^{-1} \dots l_{1w_i}^{-1} \neq r_{sw_j} \dots r_{1w_j}$, то

$$w_i^{-1} g = r_{1w_i}^{-1} \dots r_{nw_i}^{-1} K_{w_i}^{\prime-1} l_{nw_i}^{\prime-1} \dots l_{s+1w_i}^{\prime-1} r_{sw_j} \dots r_{1w_j}.$$

ТЕОРЕМА 2. [8] *Всякое конечное множество слов $W = \{w_i\}_{i \in \overline{1, N}}$ группы $\overline{G} = G_{ij} * \langle a_j; a_j^2 \rangle G_{jk}$ можно через конечное число шагов преобразовать в специальное.*

Пусть H — конечно порожденная подгруппа без кручения группы Кокстера

$$\overline{G} = G_{ij} *_{\langle a_j; a_j^2 \rangle} G_{jk}$$

с древесной структурой.

Приведем множество образующих $W = \{w_i\}_{i=\overline{1, N}}$ подгруппы H к специальному. Разобьем его на подмножества следующим образом: подмножеству M_0 принадлежат все нетрансформы, а подмножеству $M_i, i = \overline{1, k}$, принадлежат трансформы с одинаковыми крыльями, сопряженные G_{ij} или G_{jk} . С каждым из множеств $M_i, i = \overline{1, k}$, связана подгруппа $(M_i) = r_{1i}^{-1} r_{2i}^{-1} \dots r_{ni}^{-1} C_i r_{ni} \dots r_{2i} r_{1i}$, где C_i — подгруппы из G_{ij} или G_{jk} , порожденные ядрами трансформ, входящих в M_i . Упорядочим (M_i) по длинам крыльев трансформ. Получим ряд

$$(M_1) \leq (M_2) \dots \leq (M_k). \quad (4)$$

ЛЕММА 1. [12] Ряд (4) можно преобразовать в ряд

$$(M'_1) \leq (M'_2) \dots \leq (M'_{k'}), \quad (4')$$

обладающий следующими свойствами:

1. $gr((M_0), (M_1), (M_2), \dots, (M_k)) = gr((M_0), (M'_1), (M'_2), \dots, (M'_{k'}))$.
2. Если подгруппе $(M'_j) = r_{1j}^{-1} r_{2j}^{-1} \dots r_{nj}^{-1} C'_j r_{nj} \dots r_{2j} r_{1j}$ принадлежит трансформ

$$u = r_{1j}^{-1} r_{2j}^{-1} \dots r_{nj}^{-1} h_u r_{nj} \dots r_{2j} r_{1j},$$

где h_u принадлежит объединяемой подгруппе, то то среди подгрупп ряда (4') имеется подгруппа

$$(M'_l) = r_{1j}^{-1} r_{2j}^{-1} \dots r_{n-1j}^{-1} C'_l r_{n-1j} \dots r_{2j} r_{1j},$$

содержащая u .

3. Если $(M'_j) = r_{1j}^{-1} \dots r_{nj}^{-1} C'_j r_{nj} \dots r_{1j}$, $(M'_s) = r_{1j}^{-1} \dots r_{nj}^{-1} r_{n+1s}^{-1} \dots r_{ms}^{-1} C'_s r_{ms} \dots r_{n+1s} r_{nj} \dots r_{1j}$ подгруппы ряда (4') и подгруппа (M'_j) содержит трансформу $u = r_{1j}^{-1} \dots r_{nj}^{-1} h_u r_{nj} \dots r_{1j}$ либо $u' = r_{1j}^{-1} \dots r_{nj}^{-1} K_u r_{nj} \dots r_{1j}$, где $K_u = r_{n+1s}^{-1} h_u r_{n+1s}$, то существует подгруппа ряда (4') $(M'_k) = r_{1j}^{-1} \dots r_{nj}^{-1} r_{n+1s}^{-1} C'_k r_{n+1s} r_{nj} \dots r_{1j}$, содержащая в первом случае трансформу u , во втором — u' .

4. Если $(M'_j) = r_{1j}^{-1} \dots r_{nj}^{-1} C'_j r_{nj} \dots r_{1j}$ — подгруппа ряда (4') и $y^\varepsilon = l_{1y}^{-1} \dots l_{ny}^{-1} K_y r_{ny} \dots r_{n+1y} r_{nj} \dots r_{1j}$, $\varepsilon = \pm 1$, — элемент специального множества, причем подслово $r_{1j}^{-1} \dots r_{nj}^{-1} r_{n+1y}^{-1}$ не является изолированной левой половиной некоторой нетрансформы $w^\varepsilon, \varepsilon = \pm 1$, u , если подгруппа (M'_j) содержит трансформу $r_{1j}^{-1} \dots r_{nj}^{-1} h_u r_{nj} \dots r_{1j}$ или трансформу $r_{1j}^{-1} \dots r_{nj}^{-1} K_u r_{nj} \dots r_{1j}$, где $K = r_{n+1y}^{-1} h_u r_{n+1y}$, то существует подгруппа ряда (4') $(M'_l) = r_{1j}^{-1} \dots r_{nj}^{-1} r_{n+1y}^{-1} C'_l r_{n+1y} r_{nj} \dots r_{1j}$, содержащая эту трансформу.

5. Если для некоторой трансформы $u = r_{1j}^{-1} r_{2j}^{-1} \dots r_{nj}^{-1} K_u r_{nj} \dots r_{2j} r_{1j}$, принадлежащей $(M'_j) = r_{1j}^{-1} r_{2j}^{-1} \dots r_{nj}^{-1} C'_j r_{nj} \dots r_{2j} r_{1j}$, и нетрансформы y (левая половина y изолирована) из M_0 выполняется соотношение $L(y^{-1} u y) \leq L(y)$, то существует подгруппа (M'_s) ряда (4'), содержащая трансформу $y^{-1} r_{1u}^{-1} r_{2u}^{-1} \dots r_{nu}^{-1} K_u r_{nu} \dots r_{2u} r_{1u} y$, а если $L(y u y^{-1}) < L(y)$, то существует подгруппа (M'_s) ряда (4'), содержащая трансформу $y r_{1u}^{-1} r_{2u}^{-1} \dots r_{nu}^{-1} K_u r_{nu} \dots r_{2u} r_{1u} y^{-1}$.

Подгруппу, порожденную специальным множеством $W = \{w_i\}_{i=\overline{1, N}}$, обозначим через $gr(M_0, S)$, где S — подгруппа, порожденная подгруппами ряда (4').

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5. [11] Произведение $u_1 u_2 \dots u_m$, где $u_i \neq 1, i = \overline{1, m}$, $u_i \in W \cup W^{-1}$, $i = \overline{1, m}$, из подгруппы $gr(M_0, S)$ назовем словом группы $\overline{G} = G_{ij} *_{\langle a_j, a_j^2 \rangle} G_{jk}$, если

1. $u_i \neq 1$.
2. $u_i \in \{M_0 \cup M_0^{-1}\}$ либо u_i принадлежат некоторой подгруппе из ряда (4').
3. $u_i \neq u_{i+1}^{-1}, i = \overline{1, m-1}$.
4. $u_i, u_{i+1}, i = \overline{1, m-1}$, не содержатся в одной подгруппе ряда (4').
5. В $u_1 u_2 \dots u_m$ нет произведения $u_i u_{i+1} u_{i+2}, i = \overline{1, m-2}$, где

$$u_i \neq u_{i+2}^{-1}, u_i \in \{M_0 \cup M_0^{-1}\}, u_{i+1} \in (M'_j), u_i u_{i+1} u_{i+2} \in (M'_s),$$

где $(M'_j), (M'_s)$ из ряда (4').

ЛЕММА 2. [12] Всякое произведение $w_{i_1}^{\varepsilon_1} w_{i_2}^{\varepsilon_2} \dots w_{i_n}^{\varepsilon_n}, \varepsilon_j = \pm 1$, где w_{ij} — образующие подгруппы $\langle W \rangle$, через конечное число шагов можно привести к слову $u_1 u_2 \dots u_{im}, m \leq n$, подгруппы $gr(M_0, S) = \langle W \rangle$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6. Будем говорить, что между словами v_1 и v_2 имеет место касание первого, второго или третьего рода, если длина произведения $v_1 v_2$ соответственно больше, равна или меньше максимальной из длин $L(v_1), L(v_2)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7. [11] Слово $u_1 u_2 \dots u_m$ будем называть простым, если

$$L(u_1 u_2 \dots u_m) = \max\{L(u_1), L(u_2), \dots, L(u_m)\}.$$

ЛЕММА 3. [12] Пусть $u_1 u_2 \dots u_m$ — слово из подгруппы $gr(M_0; S)$. Тогда

$$L(u_1 u_2 \dots u_m) \geq L(u_i), i = \overline{1, m}.$$

СЛЕДСТВИЕ 2. [12] Если в слове $u_1 u_2 \dots u_m$ выполнить сокращение в группе $\overline{G}$, то оно не затронет, по крайней мере, левую половину слова u_1 .

СЛЕДСТВИЕ 3. [12] Всякое слово подгруппы $gr(M_0; S)$ может быть представлено в виде произведения простых слов, между которыми имеет место касание первого рода.

Подгруппа $gr(M_0, S)$, порожденная специальным множеством слов $W = \{w_i\}_{i=\overline{1, N}}$ представляет собой HNN -группу с основой S , являющуюся древесным произведением, правильной системой проходных букв которой служат элементы из M_0 . Подгруппы (M_0) и $(M'_j), j = \overline{1, k'}$, ряда (4') будем называть порождающими подгруппами $\langle W \rangle = gr(M_0, S)$.

ЛЕММА 4. [13] Пусть W — специальное множество слов группы $\overline{G}$ и $H = \langle W \rangle$ — подгруппа $\overline{G}$ и пусть $w_i^\varepsilon = l_1 \dots l_m K_{w_i} r_m \dots r_1$ — элемент специального множества, $v = l_1 \dots l_t, t \leq m$, — начальное подслово левой половины w_i^ε , причем v не является изолированной левой половиной w_i^ε . Тогда если $A_v = H \cap l_1 \dots l_t A_j l_t^{-1} \dots l_1^{-1} \neq E$, где $A_j = G_{ij}$, если $l_t \in G_{ik}$ либо $A_j = G_{ik}$, если $l_t \in G_{ij}$, то ряд (4') содержит подгруппу $(M'_s) = A_v$.

ЛЕММА 5. [12] Подгруппа (M_0) , порожденная нетрансформами специального множества, свободна.

ЛЕММА 6. [12] $(M_0) \cap (S)^{gr(M_0; S)} = E$, где E — единичная подгруппа.

ЛЕММА 7. [13] В группе Кокстера с древесной структурой образующие сопряжены тогда и только тогда, когда существует ломаная, состоящая из ребер древо-графа, которая соединяет вершины, соответствующие данным образующим группы, и каждому из ребер выделенного пути соответствует соотношение с нечетным числом Кокстера.

ЛЕММА 8. [8] Пусть $H_1 = \text{gp}(M_0; S_1)$ и $H_2 = \text{gp}(M'_0; S'_1)$ — две конечно порожденные подгруппы группы $\bar{G}$. Основа S подгруппы H_1 порождена подгруппами ряда

$$(M_1) \leq (M_2) \leq \dots \leq (M_{k_1}), \quad (6)$$

основа S' подгруппы H_2 порождена подгруппами ряда

$$(M'_1) \leq (M'_2) \leq \dots \leq (M'_{k_2}). \quad (6')$$

Тогда если H_1 и H_2 сопряжены в $\bar{G}$, то есть существует $z \in \bar{G}$ такое, что $z^{-1}H_1z = H_2$, то существуют $w \in \text{gp}(M'_0; S'_1)$, $i \in \overline{1, k_1}$, $j \in \overline{1, k_2}$, такие, что $(M_i) = w^{-1}z^{-1}(M'_j)zw$, где (M_i) — подгруппа ряда (6), а (M'_j) — подгруппа ряда (6').

Пусть группе Кокстера с древесной структурой G соответствует конечный дерево-граф Γ : вершинам графа Γ соответствуют образующие a_i , $i \in \overline{1, n}$, а всякому ребру e , соединяющему вершины с образующими a_i и a_j , соответствует соотношение $(a_i a_j)^{m_{ij}} = 1$.

Ребро e' дерева-графа Γ назовем замыкающим ребром некоторого пути, если ему соответствует четное число Кокстера.

ЛЕММА 9. [13] Пусть G — конечно порожденная группа Кокстера с древесной структурой; слово $w \in G$ такое, что $|w| = 1$, то есть $w = a_i$, $i \in \overline{1, n}$. Тогда централизатор элемента w есть подгруппа вида

$$C(w) = \langle \tilde{z}_1, \tilde{z}_2, \dots, \tilde{z}_s, w; \tilde{z}_r^2 = 1, w^2 = 1, r = \overline{1, s} \rangle,$$

где $\tilde{z}_r$ — циклически сократимое слово вида $\tilde{z}_r = z_1 z_2 \dots z_{t-1} z_0 z_{t-1}^{-1} \dots z_2^{-1} z_1^{-1}$, где $z_i \in G_{ij}$, подслово z_0 соответствует замыкающему ребру и $|z_i| = m_{ij} - 1$, $i = \overline{0, t-1}$.

3. Основная теорема

ТЕОРЕМА 3. Нормализатор произвольной конечно порожденной подгруппы группы Кокстера $\bar{G}$ с древесной структурой конечно порожден. Существует алгоритм, выписывающий образующие данного нормализатора.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть H — конечно порожденная подгруппа группы Кокстера

$$\bar{G} = G_{ij} *_{\langle a_j; a_j^2 \rangle} G_{jk}$$

с древесной структурой. Приведем множество образующих $W = \{w_i\}_{i \in \overline{1, N}}$ подгруппы H к специальному: $H = \text{gp}(M_0; S)$, где основа S порождена подгруппами ряда

$$(M_1) \leq (M_2) \leq \dots \leq (M_k), \quad (5)$$

причем (M_0) — свободная часть, $(M_i) = v_i^{-1} C_i v_i$, $C_i \in G_{ij}$ или $C_i \in G_{jk}$, $i \in \overline{1, k}$.

Найдем все элементы $Z \in N_G(H)$, порождающие $N_G(H)$. Наша задача — показать, что таких элементов существует лишь конечное число, если H конечно порождена.

Возможны следующие случаи.

Случай 1. Пусть $H = \text{gp}(M_0; S)$, причем основа S есть единица, то есть $H = (M_0)$ и является свободной подгруппой в $\bar{G}$. Пусть $H = \langle X_1, X_2, \dots, X_n \rangle$. Рассмотрим слово $Z \in \bar{G}$ такое, что справедливо равенство $Z^{-1}HZ = H$. Если $u_1, u_2 \in H$, $Z \in N_{\bar{G}}(H)$, то $Z_0 = u_1 Z u_2 \in N_{\bar{G}}(H)$. Поэтому Z будем выбирать наименьшим в двойном классе смежности HZH .

Образующие $\{X_i\}_{i \in \overline{1, n}}$ являются специальными и удовлетворяют условиям:

1. Левая половина каждого $X_i \in \{X_i\}_{i=\overline{1,n}}$, имеющего нечетную длину, изолирована в $\{\{X_j\} \setminus X_i\}_{j=\overline{1,n}} \cup \{\{X_j^{-1}\} \setminus X_i^{-1}\}_{j=\overline{1,n}}$. Левая и правая половины каждого $X_i \in \{X_i\}_{i=\overline{1,n}}$, имеющего четную длину, изолированы в $\{\{X_j\} \setminus X_i\}_{j=\overline{1,n}} \cup \{\{X_j^{-1}\} \setminus X_i^{-1}\}_{j=\overline{1,n}}$.

2. Большой начальный и большой конечный отрезки каждого $X_i \in \{X_i\}_{i=\overline{1,n}}$ изолированы в множестве $\{\{X_j\} \setminus X_i\}_{j=\overline{1,n}} \cup \{\{X_j^{-1}\} \setminus X_i^{-1}\}_{j=\overline{1,n}}$.

3. Для каждого $X_i \in \{X_i\}_{i=\overline{1,n}}$ справедливо соотношение $L(w_1^{\varepsilon_1} X_i w_2^{\varepsilon_2}) \geq L(X_i)$, где

$$w_s \in \{\{X_j\} \setminus X_i\}_{j=\overline{1,n}}, \varepsilon_s = \pm 1, s = \overline{1,2}.$$

Выберем среди образующих $\{X_i\}_{i=\overline{1,n}}$ из H циклически несократимый X (если все образующие H циклически сократимы, то берем $X_i = cXc^{-1}$, где X — циклически несократимо. От подгруппы H перейдем к подгруппе $H' = cHc^{-1}$, имеющей циклически несократимый элемент; если подгруппы сопряжены, то сопряжены и их нормализаторы).

Пусть $L_0 = \max\{L(X_1), L(X_2), \dots, L(X_n)\}$. Будем рассматривать произведение

$$Z^{-1}XZ = X_{i1}^{\varepsilon_1} \dots X_{ik}^{\varepsilon_k}, \varepsilon_s = \pm 1, s = \overline{1,k}.$$

$L(XZ) \geq L(Z)$, $L(Z^{-1}X) \geq L(Z)$, в противном случае Z не удовлетворяет условию минимальности. Так как X циклически несократимо, то в слове $Z^{-1}XZ$ одновременно не может происходить сокращение в $Z^{-1}X$ и XZ . Пусть между X и Z сокращение не происходит. Допустим, оно происходит между Z^{-1} и X , причем не может сократиться более половины X , иначе длину Z можно уменьшить.

Предположим, $L(Z) > L_0/2$. Представим слово $X_{i1}^{\varepsilon_1} \dots X_{ik}^{\varepsilon_k}$ в виде произведения простых слов, между которыми имеет место касание первого рода, то есть

$$Z^{-1}XZ = X_{i1}^{\varepsilon_1} \dots X_{ik}^{\varepsilon_k} = v_1 v_2 \dots v_p,$$

причем $L(v_p) \leq L_0$. Рассмотрим произведение $v_{p-1}v_p$. Здесь сокращение не затрагивает ядер v_{p-1}, v_p . Так как более половины v_p укладывается в Z , то длину Z можно сократить, умножая справа на v_p^{-1} . Противоречие. Таким образом, $p > 1$ быть не может.

Пусть $p = 1$ и $Z^{-1}XZ = v_1$. Тогда $L(Z) > L_0/2$ и $L(Z^{-1}X) > L_0/2$, что невозможно. Таким образом, $L(Z) \leq L_0/2$.

Используя строение простого слова, получаем, что Z можно выбрать как подслово левой или правой половины некоторого образующего X_i из H .

Случай 2. Пусть $H = gp(M_0; S)$, причем основа S не единична и порождена подгруппами ряда (5). Имеем

$$Z^{-1}gp(M_0; S)Z = gp(M_0; S).$$

Приведем образующие подгруппы $Z^{-1}gp(M_0; S)Z$ к специальным образующим.

По лемме 8 существуют $w \in gp(M_0; S)$, l, t такие, что

$$w^{-1}Z^{-1}(M_l)Zw = (M_t), \quad (7)$$

где $(M_l) = v_l^{-1}C_l v_l$, $C_l \in G_{ij}$ или $C_l \in G_{jk}$, $(M_t) = v_t^{-1}C_t v_t$, $C_t \in G_{ij}$ или $C_t \in G_{jk}$.

Перепишем соотношение (7) в следующем виде

$$w^{-1}Z^{-1}v_l^{-1}C_l v_l Z w = v_t^{-1}C_t v_t$$

или

$$v_t w^{-1}Z^{-1}v_l^{-1}C_l v_l Z w v_t^{-1} = C_t. \quad (8)$$

Из (7) далее получим

$$(v_t w^{-1}Z^{-1}v_l^{-1})v_l gp(M_0; S)v_l^{-1}(v_l Z w v_t^{-1}) = v_t gp(M_0; S)v_t^{-1}. \quad (9)$$

Приведем образующие подгрупп $v_l gp(M_0; S)v_l^{-1}, v_t gp(M_0; S)v_t^{-1}$ из (9) к специальным образующим. Полученные подгруппы обозначим $gp(M'_0; S') = H_1, gp(M''_0; S'') = H_2$ соответственно. Основа S' порождена подгруппами

$$(M'_1) \leq (M'_2) \dots \leq (M'_{k'}).$$

Основа S'' порождена подгруппами

$$(M''_1) \leq (M''_2) \dots \leq (M''_{k''}).$$

Пусть $v_l Zw v_t^{-1} = \tilde{w}$.

Тогда (9) имеет вид

$$\tilde{w}^{-1} gp(M'_0; S') \tilde{w} = gp(M''_0; S'')$$

или

$$\tilde{w}^{-1} H_1 \tilde{w} = H_2.$$

Слово $\tilde{w}$ будем выбирать наименьшим в двойном смежном классе $H_1 \tilde{w} H_2$.

Случай 2.1. Каждая подгруппа $(M_i), i = \overline{1, k}$, ряда (5) сопряжена с объединяемой подгруппой.

В данном случае (8) будет иметь вид:

$$v_t w^{-1} Z^{-1} v_l^{-1} a_j v_l Zw v_t^{-1} = a_j$$

или

$$\tilde{w}^{-1} a_j \tilde{w} = a_j.$$

Таким образом, $\tilde{w}$ принадлежит централизатору элемента a_j .

По лемме 9 централизатор элемента a_j в группе G имеет вид:

в случае, когда числа m_{ij} и m_{jk} — четные, имеем $C(a_j) = \langle a_j, z_1, z_2; a_j^2, z_r^2, r = \overline{1, 2} \rangle$, $z_1 \in G_{ij}, z_2 \in G_{jk}, |z_1| = m_{ij} - 1, |z_2| = m_{jk} - 1$;

если числа m_{ij}, m_{jk} — разной четности, например, m_{ij} — четное, а m_{jk} — нечетное, то $C(a_j) = \langle a_j, z_1; a_j^2, z_1^2 \rangle, z_1 \in G_{ij}, |z_1| = m_{ij} - 1$;

и, наконец, если числа m_{ij} и m_{jk} — нечетные, то $C(a_j) = \langle a_j; a_j^2 \rangle$.

Рассмотрим каждый из этих случаев.

Случай, когда $C(a_j) = \langle a_j; a_j^2 \rangle$, очевиден.

Пусть $C(a_j) = \langle a_j, z_1, z_2; a_j^2, z_r^2, r = \overline{1, 2} \rangle$.

Поскольку слово $\tilde{w}$ является наименьшим в двойном смежном классе $H_1 \tilde{w} H_2$, то оно может иметь один из видов: $\tilde{w} = (z_1 z_2)^k$; $\tilde{w} = (z_1 z_2)^k z_1$; $\tilde{w} = z_1$.

Мы будем пренебрегать образующим a_j , поскольку он лежит в объединяемой подгруппе.

Покажем, что в каждом из приведенных случаев можно ограничить показатель k .

Пусть $\tilde{w} = (z_1 z_2)^k$. Рассмотрим двойной класс смежности $H_1 (z_1 z_2)^k H_2$. Если $z_1 z_2 \in H_1$, то $k = 0$.

Если $(z_1 z_2)^t \in H_1$, где t — наименьший возможный показатель степени, $k < t$, то можно найти показатель степени t' , при котором $(z_1 z_2)^{t'} \notin H_1$ и показатель степени t'' , при котором $(z_1 z_2)^{t''} \notin H_2$, тогда ограничить показатель k можно, выбрав $k < \max\{t', t''\}$.

В случае, если $(z_1 z_2)^t z_1 \in H_1$, где t — наименьший возможный показатель степени, $k < t$, поступаем аналогично.

В других случаях рассмотрим стыки H_1 с $(z_1 z_2)^k$ и $(z_1 z_2)^k$ с H_2 . Проведем рассуждения для первого стыка, рассуждения для второго — симметричны.

Допустим, что $(z_1 z_2)^t z'_1 \in H_1$, где $z_1 = z'_1 z''_1$, тогда будем искать пересечение классов смежности $z''_1 z_2 < z_1 z_2 > \cap H_2$.

Если $(z_1 z_2)^t z_1 z_2' \in H_1$, где $z_2 = z_2' z_2''$, то будем искать пересечение классов смежности $z_2'' < z_1 z_2 > \cap H_2$.

Для ограничения длины слова $\tilde{w}$, перепишем общую часть $\tilde{w}$ с подгруппой H_1 в u -символах подгруппы H_1 , а общую часть слова $\tilde{w}$ с подгруппой H_2 — в u -символах подгруппы H_2 . Итак, нам надо для некоторого z , описанного выше, найти пересечение смежных классов $z < z_1 z_2 > \cap H_2$ и, аналогично, $< z_1 z_2 > \tilde{z} \cap H_1$ (или $\tilde{z}^{-1} < z_1 z_2 > \cap H_1$). Для ограничения длины слова $\tilde{w}$ будем использовать метод типов [14]. Обозначим подгруппу $< z_1 z_2 >$ через H_0 .

Изложим суть данного метода. Пусть произвольная конечно порожденная подгруппа H' группы $\overline{G}$ порождена специальным множеством слов. Каждый элемент $g \neq 1$ из H' имеет запись в w -символах: $b = w_{i1}^{\varepsilon_1} w_{i2}^{\varepsilon_2} \dots w_{il}^{\varepsilon_l}$, $\varepsilon_j = \pm 1$, где w_{ij} — образующие $< W >$ подгруппы H' . По лемме 2 приведем его к слову в u -символах: $b = u_1 \dots u_m$. Выполнив в полученном слове все возможные сокращения, получим слоговую запись $b = b_1 b_2 \dots b_k$.

ЛЕММА 10. [15] Каждый слог $b_i, i = \overline{1, k}$, слова $b = b_1 b_2 \dots b_k$ имеет вид:

$$b_i = a'_i x_i y_i z_i a''_i, \quad (10)$$

где x_i — центральный или правый слог u_{s-1} , y_i — центральный слог трансформы u_s , z_i — левый или центральный слог u_{s+1} , a'_i и a''_i — элементы из объединяемой подгруппы $< a_j; a_j^2 >$.

Заметим, что каждое из a'_i и a''_i в лемме 10 либо есть единица, либо a_j .

Найдем пересечение $zH_0 \cap H_2$.

Пусть $zH_0 \cap H_2$ не пусто и $v \in zH_0 \cap H_2, v \neq 1$. Тогда существуют такие $h_0 \in H_0, h_2 \in H_2$, что $zh_0 = h_2$. Перепишем h_0, h_2 в u -символах подгрупп H_0, H_2 соответственно. Получим:

$$w = zu_1^{(0)} u_2^{(0)} \dots u_r^{(0)} = u_1^{(2)} u_2^{(2)} \dots u_r^{(2)} = w_0 b_1 b_2 \dots b_k. \quad (11)$$

Последняя запись в равенстве (11) дает несократимую запись слова w в группе $\overline{G}$, w_0 — начальное подслово слова w .

Будем называть $v^{(s)-1} \alpha_i^{(s)} v^{(s)}$ типом трансформ порождающей подгруппы

$$M_i^{(s)} = v^{(s)-1} C_i v^{(s)}$$

подгруппы $H_s, s \in \{0, 2\}$, группы $\overline{G}$ и обозначать его $(v^{(s)}, i)$. Символом $L((v^{(s)}, i)) = 2L(v^{(s)}) + 1$ будем обозначать длину типа $(v^{(s)}, i)$, а символом $T^{(s)}$ множество всех типов трансформ подгруппы $H^{(s)}$.

Пополним множество $T^{(s)}$ символом $\beta^{(s)} \notin \overline{G}$, получим множество $\tilde{T}^{(s)}$. Обозначим $R^{(s)}$ множество $M_0^{(s)} \cup M_0^{(s)-1} \cup \tilde{T}^{(s)}$, соответствующее подгруппе $H_s, s \in \{0, 2\}$. Присоединим к множеству $R^{(s)}$ символ $\gamma^{(s)} \notin \overline{G}$, получим множество $\tilde{R}^{(s)}$.

Соотношения (11) определяют следующее отображение:

$$\begin{aligned} \psi_w : \{1, 2, \dots, k\} \rightarrow \{((\mathbb{Z}^+ \times (\tilde{R}^{(0)} \times \mathbb{Z}^+) \times \tilde{T}^{(0)} \times (\tilde{R}^{(0)} \times \mathbb{Z}^+) \times \mathbb{Z}^+) \times \\ \times (\mathbb{Z}^+ \times (\tilde{R}^{(2)} \times \mathbb{Z}^+) \times \tilde{T}^{(2)} \times (\tilde{R}^{(2)} \times \mathbb{Z}^+) \times \mathbb{Z}^+))\}, \end{aligned} \quad (12)$$

где $\mathbb{Z}^+$ — множество натуральных чисел с нулем, которое согласно лемме 10 определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} \psi_w(i) = ((p_0^{(0)}(i), (r_1^{(0)}(i), p_1^{(0)}(i)), \tau_1^{(0)}(i), (r_2^{(0)}(i), p_2^{(0)}(i)), p_0^{(0)}(i)), \\ (p_0^{(2)}(i), (r_1^{(2)}(i), p_1^{(2)}(i)), \tau_1^{(2)}(i), (r_2^{(2)}(i), p_2^{(2)}(i)), p_0^{(2)}(i))), \end{aligned} \quad (12')$$

здесь номер i соответствует слогу $b_i = a_i^{(s)} x_i^{(s)} y_i^{(s)} z_i^{(s)} a_i^{(s)}$ из w , $p_0^{(s)}(i)$ — номер элемента $a_i^{(s)}$ в подгруппе $< a_j; a_j^2 >$, то есть принимает значения 0 или 1; $r_1^{(s)}(i) = \gamma^{(s)}$, если $x_i^{(s)} = 1$, то есть

$x_i^{(s)}$ не принимает участия в образовании слога b_i ; $r_1^{(s)}(i) = w_1^{(s)}(i) \in \tilde{R}^{(s)} \setminus \{\gamma^{(s)}\}$, если $x_i^{(s)} \neq 1$ и является $p_1^{(s)}(i)$ -м слогом в $w_1^{(s)}(i)$; $\tau_1^{(s)}(i) = \beta^{(s)}$, если $y_i^{(s)} = 1$; $\tau_1^{(s)}(i) = (v^{(s)}, j)$, если $y_i^{(s)}$ — слог трансформы типа $(v^{(s)}, j)$; $r_2^{(s)}(i) = \gamma^{(s)}$, если $z_i^{(s)} = 1$; $r_2^{(s)}(i) = w_2^{(s)}(i) \in \tilde{R}^{(s)} \setminus \{\gamma^{(s)}\}$, если $z_i^{(s)} \neq 1$ и является $p_2^{(s)}(i)$ -м слогом в $w_2^{(s)}(i)$; $p_0^{(s)}(i)$ — номер элемента $a_i^{(s)}$ в подгруппе $\langle a_j; a_j^2 \rangle$.

Учитывая, что H_0 есть $\langle z_1 z_2 \rangle$ в формуле (12'): $p_0^{(0)}(i) = 1, p_0^{(0)}(i) = 1$ и, в силу того, что $y_i^{(0)} = 1$, имеем $\tau_1^{(0)}(i) = \beta^{(0)}$.

Назовем $\psi_w(i)$ типом слога b_i слова w .

Мощность множества всех типов, согласно (12), (12') ограничена числом:

$$A_2 = 4(2 \sum_{w^{(2)} \in \tilde{R}^{(2)} \setminus \{\gamma^{(2)}\}} L(w^{(2)} + 1)^2 |\tilde{T}^{(2)}| (L(z_1 z_2) + 1)^2.$$

ЛЕММА 11. [16] Если $L(w) > A_2$, где w — слово из (11) и $w \in H_2, w \neq 1$, то существует слово $w' \in H_2, L(w') < L(w)$, удовлетворяющее (11).

Из [16] следует, что для слова $u_1^{(2)} u_2^{(2)} \dots u_{r_2}^{(2)}$ из (11)

$$L(u_1^{(2)} u_2^{(2)} \dots u_{r_2}^{(2)}) \leq A_2 + L(w_0).$$

Аналогично рассуждаем, рассматривая пересечение $\tilde{z}^{-1} \langle z_1 z_2 \rangle \cap H_1$.

Итак, мощность множества всех типов для подгрупп H_1, H_2 соответственно ограничена числами:

$$A_j = 4(2 \sum_{w^{(j)} \in \tilde{R}^{(j)} \setminus \{\gamma^{(j)}\}} L(w^{(j)} + 1)^2 |\tilde{T}^{(j)}| (L(z_1 z_2) + 1)^2, j = \overline{1, 2}.$$

Следовательно, длину слова $\tilde{w}$ можно ограничить следующим образом: $\tilde{w} \leq 2A$, где $A = \max\{A_1, A_2\}$.

Пусть $\tilde{w} = (z_1 z_2)^k z_1$. Рассмотрим двойной класс смежности $H_1(z_1 z_2)^t z_1 H_2$. Рассуждения аналогичны случаю, когда $\tilde{w} = (z_1 z_2)^k$.

Если $\tilde{w} = z_1$, тогда, как и выше, $|z_1| = m_{ij} - 1, z_1 \in G_{ij}$. В этом случае $\tilde{w} \in G_{ij}$.

Аналогично предыдущему случаю, рассматривается случай $C(a_j) = \langle a_j, z_1; a_j^2, z_1^2 \rangle, z_1 \in G_{ij}, |z_1| = m_{ij} - 1$.

Таким образом, слово $\tilde{w}$ будем брать из централизатора $C(a_j)$ с учетом ограничения на длину.

Случай 2.2. Пусть подгруппы C_l, C_t содержатся в подгруппе G_{ij} или подгруппе G_{jk} . Рассмотрим возможные случаи.

Допустим, что C_l, C_t порождаются элементом единичной длины, не принадлежащим объединяемой подгруппе.

Пусть $C_l = C_t = \langle a_i; a_i^2 \rangle$. Тогда (8) имеет вид

$$\tilde{w}^{-1} a_i \tilde{w} = a_i.$$

Если числа m_{ij}, m_{jk} — четные или m_{ij} — четное, а m_{jk} — нечетное, то $C(a_i) = \langle a_i, z_1; a_i^2, z_1^2 \rangle$, где $z_1 \in G_{ij}, |z_1| = m_{ij} - 1$. Этот случай рассмотрен выше.

Если числа m_{ij} — нечетное, а m_{jk} — четное, то $C(a_i) = \langle a_i, z_1 z_2 z_1^{-1}; a_i^2, (z_1 z_2 z_1^{-1})^2 \rangle, z_1 \in G_{ij}, |z_1| = m_{ij} - 1, z_2 \in G_{jk}, |z_2| = m_{jk} - 1$. В этом случае длина слова $\tilde{w}$ ограничена.

Если числа m_{ij}, m_{jk} — нечетные, то $C(a_i) = \langle a_i; a_i^2 \rangle$. Этот случай очевиден.

Пусть $C_l = \langle a_i; a_i^2 \rangle$ и $C_t = \langle a_k; a_k^2 \rangle$. По лемме 7 если m_{ij}, m_{jk} — нечетные, то $\tilde{w} = \tilde{w}'\tilde{w}''$, где $w' \in G_{jk}$, $w'' \in G_{ij}$, причем $|\tilde{w}'| = m_{jk} - 1$, $|\tilde{w}''| = m_{ij} - 1$. Тогда $|\tilde{w}| \leq (m_{ij} - 1)(m_{jk} - 1)$. Пусть $m = \max\{m_{ij}, m_{jk}\}$. Тогда $|\tilde{w}| < m^2 + 1$.

Пусть C_l, C_t порождаются элементом длины больше единицы и содержатся в одной подгруппе G_{ij} или G_{jk} . Предположим, G_{ij} . В этом случае $\tilde{w}$ также принадлежит подгруппе G_{ij} и $|\tilde{w}| < 2m_{ij}$.

Пусть C_l, C_t порождаются элементом длины больше единицы и содержатся в разных подгруппах G_{ij}, G_{jk} . Этот случай невозможен, так как слова конечного порядка длины больше единицы, принадлежащие разным подгруппам не могут быть сопряжены в $\bar{G}$.

В случае 2 мы показали, что длину $\tilde{w}$ всегда можно ограничить.

Имеем $Z = v_l^{-1}\tilde{w}v_tw^{-1}$. Элементов $v_l, \tilde{w}, v_t$ конечное число, элемент w^{-1} принадлежит H , поэтому элементов Z конечное число. Далее нужно построить все такие Z и проверить равенство $Z^{-1}HZ = H$. Теорема доказана.

4. Заключение

В данной работе рассмотрен вопрос о конечной порожденности и построении нормализатора конечно порожденной подгруппы H в свободном произведении $\bar{G} = G_{ij} *_{\langle a_j; a_j^2 \rangle} G_{jk}$ двупорожденных групп Кокстера G_{ij} и G_{jk} с древесной структурой, объединенных по циклической подгруппе $\langle a_j; a_j^2 = 1 \rangle$.

Основными методами доказательства являются: метод специального множества слов [11], разработанный В. Н. Безверхним как обобщение метода Нильсена [17] на свободные произведения групп с объединением и HNN -расширения; метод типов [14]. Кроме того, используются: результат В. Н. Безверхнего и О. В. Инченко [13] об описании централизатора образующего в группах Кокстера с древесной структурой, результат О. В. Инченко [16] о нахождении пересечения классов смежности конечно порожденных подгрупп в группах Кокстера с древесной структурой, а также решение проблемы вхождения в группах Кокстера с древесной структурой, полученное из теоремы В. Н. Безверхнего [10].

Доказанная в данной статье теорема является базой в исследовании вопроса о конечной порожденности нормализатора конечно порожденной подгруппы в группах Кокстера с древесной структурой.

Полученный автором результат можно рассматривать как некоторое обобщение результата И. С. Безверхней [18] о конечной порожденности нормализатора в свободном произведении групп, где сомножители обладают свойством: нормализатор всякой конечно порожденной подгруппы конечно порожден.

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безверхний В. Н., Добрынина И. В. О проблеме свободы в группах Кокстера с древесной структурой // Известия Тульского государственного университета. Естественные науки. 2014. №1-1. С. 5-13.
2. Coxeter H. S. M. Discrete groups generated by reflections // Ann. Math. 1934. Vol. 35. P. 588-621.
3. Appel K., Schupp P. Artins groups and infinite Coxeter groups // Invent. Math. 1983. Vol. 72. P. 201-220.
4. Лысенко И. Г. О некоторых алгоритмических свойствах гиперболических групп // Изв. АН СССР. Сер. матем. 1989. Т. 53, №4. С. 814-832.

5. Безверхний В. Н., Добрынина И. В. Решение проблемы степенной сопряженности слов в группах Кокстера экстрабольшого типа // Дискрет. матем. 2008. Т.20, №3. С. 101–110.
6. Безверхний В. Н., Добрынина И. В. Решение проблемы сопряженности слов в группах Кокстера большого типа // Чебышевский сб. 2003. Т.4, №1. С. 10–33.
7. Безверхний В. Н., Добрынина И. В. Решение проблемы обобщенной сопряженности слов в группах Кокстера большого типа // Дискрет. матем. 2005. Т.17, №3. С. 123–145.
8. Безверхний В. Н., Инченко О. В. Проблема сопряженности подгрупп в конечно порожденных группах Кокстера с древесной структурой // Чебышевский сб. 2010. Т.11, №3. С. 32–56.
9. Безверхний В. Н., Добрынина И. В. О нормализаторах некоторых классов подгрупп в группах кос // Матем. заметки. 2003. Т.74, №1. С. 19–31.
10. Безверхний В. Н. Решение проблемы вхождения в некоторых классах групп с одним определяющим соотношением // Алгоритмические проблемы теории групп и полугрупп. 1986. С. 3–21.
11. Безверхний В. Н. Решение проблемы вхождения для одного класса групп // Вопросы теории групп и полугрупп. 1972. С. 3–86.
12. Безверхний В. Н. О пересечении подгрупп в HNN -группах // Фундаментальная и прикладная математика. 1998. Т.4, №1. С. 199–222.
13. Безверхний В. Н., Инченко О. В. Централизатор элементов конечного порядка конечно порожденной группы Кокстера с древесной структурой // Чебышевский сб. 2008. Т. 9, №1. С. 17–27.
14. Безверхний В. Н., Роллов Е. В. О подгруппах свободного произведения групп // Современная алгебра. 1974. Т.1. С. 16–31.
15. Безверхняя И. С. О корневом замыкании подгрупп свободного произведения групп с объединением // Алгоритмические проблемы теории групп и полугрупп. 1983. С. 81–112.
16. Инченко О. В. О проблеме пересечения классов смежности конечно порожденных подгрупп в группе Кокстера с древесной структурой // Чебышевский сб. 2016. Т.17, №2. С. 146–161.
17. Линдон Р., Шупп П. Комбинаторная теория групп. М.: Мир, 1980. 440 с.
18. Безверхняя И. С. О сопряженности конечных множеств подгрупп в свободном произведении групп // Алгоритмические проблемы теории групп и полугрупп. 1981. С. 102–116.

REFERENCES

1. Bezverhnii, V. N. & Dobrynina, I. V. 2014, “On freedom problem in Coxeter groups with tree-structure“, *Izvestija TulGU. Estestven nauki*, vol. 1, no. 1, pp. 5–14.
2. Coxeter, H. S. M., 1934, “Discrete groups generated by reflections“, *Ann. Math.*, vol. 35, pp. 588–621.
3. Appel, K., Schupp, P., 1983, “Artins groups and infinite Coxeter groups“, *Invent. Math.*, vol. 72, pp. 201–220.

4. Lysenok, I. G., 1990, "On some algorithmic properties of hyperbolic groups", *Math. USSR-Izv.*, vol. 35, no. 1, pp. 145-163.
5. Bezverkhii, V. N. & Dobrynina, I. V., 2008, "A solution of the power conjugacy problem for words in the Coxeter groups of extra large type", *Diskr. Mat.*, vol. 20, no. 3, pp. 101-110.
6. Bezverkhii, V. N. & Dobrynina, I. V., 2003, "Solution of the conjugacy problem for words in Coxeter groups of large type", *Chebyshevskii Sb.*, vol. 4, no. 1, pp. 10-33.
7. Bezverkhii, V. N. & Dobrynina, I. V., 2005, "Solution of the generalized conjugacy problem for words in Coxeter groups of large type", *Diskr. Mat.*, vol. 17, no. 3, pp. 123-145.
8. Bezverkhii, V. N. & Inchenko O. V., 2010, "Conjugacy problem of subgroups in finitely generated Coxeter groups with tree structure", *Chebyshevskii Sb.*, vol. 11, no. 3, pp. 32-56.
9. Bezverkhii, V. N. & Dobrynina, I. V., 2003, "Normalizers of Some Classes of Subgroups in Braid Groups", *Mat. Zametki*, vol. 74, no. 1, pp. 19-31.
10. Bezverkhii, V. N., 1986, "Solution of the occurrence problem in some classes of groups with one defining relation", *Algorithmic problems of theory of groups and semigroups*, pp. 3-21.
11. Bezverkhii, V. N., 1972, "The occurrence problem for a class of groups", *Questions of theory of groups and semigroups*, pp. 3-86.
12. Bezverkhii, V. N., 1998, "On the intersection subgroups HNN -groups", *Fundam. Prikl. Mat.*, vol. 4, no. 1, pp. 199-222.
13. Bezverkhii, V. N. & Inchenko, O. V., 2010, "The centralizer of elements of finite order of a finitely generated Coxeter group with a tree structure", *Chebyshevskii Sb.*, vol. 9, no. 1, pp. 17-27.
14. Bezverkhii, V. N. & Rollov E. V., 1974, "On subgroups of free products of groups", *Modern algebra*, vol. 1, pp. 16-31.
15. Bezverkhnyaya, I. S., 1983, "On root closure of subgroups of amalgamated product of groups", *Algorithmic problems of theory of groups and semigroups*, pp. 81-112.
16. Inchenko, O. V., 2016, "About the problem of intersection of the adjacency classes of finitely generated subgroups of Coxeter's group with tree structure", *Chebyshevskii Sb.*, vol. 17, no. 2, pp. 146-161.
17. Lindon, P. & Shupp, P., 1980, "Combinatory theory of groups", World, Moscow.
18. Bezverkhnyaya, I. S., 1981, "On conjugacy of finite sets of subgroups in free product of groups", *Algorithmic problems of theory of groups and semigroups*, pp. 102-116.

Получено 16.04.2016 г.

Принято в печать 10.06.2016 г.