ЧЕБЫШЕВСКИЙ СБОРНИК

Том 20. Выпуск 2.

УДК 511.3

DOI 10.22405/2226-8383-2019-20-2-123-139

Распределение значений функции Жордана в классах вычетов

Л. А. Громаковская, Б. М. Широков

Громаковская Лариса Александровна — старший преподаватель, Петрозаводский государственный университет (г. Петрозаводск).

e-mail: gromak_la@mail.ru

Широков Борис Михайлович — кандидат физико-математических наук, доцент, Петрозаводский государственный университет (г. Петрозаводск).

e-mail: bmshir@mail.ru

Аннотация

Понятие равномерного распределения целозначных арифметических функций в классах вычетов по модулю N было введено И. Нивеном [3]. Для мультипликативных функций более удобным оказалось понятие слабо равномерного распределения по модулю N , которое было введено В. Наркевичем [6].

В работах о распределении в классах вычетов обычно приводятся асимптотические формулы для числа попаданий значений функции в тот или иной класс, содержащие лишь главные члены, что объясняется применением к производящим функциям тауберовой теоремы Х. Деланжа [12], хотя эти производящие функции обладают лучшими аналитическими свойствами, чем это нужно для теоремы Х. Деланжа.

В настоящей работе рассматривается распределение значений функции Жордана $J_2(n)$. Для натурального числа n значение $J_2(n)$ есть количество попарно несравнимых между собой примитивных по модулю n пар целых чисел. Доказывается, что $J_2(n)$ слабо равномерно распределена по модулю N тогда и только тогда, когда N взаимно просто с числом 6. Кроме того, работа содержит асимптотическую формулу, представляющую собой асимптотический ряд, что достигается применением леммы 3, являющейся теоремой тауберова типа, заменяющей теорему Х. Деланжа.

Ключевые слова: тауберовы теоремы, распределение значений, классы вычетов

Библиография: 17 названий.

Для цитирования:

Л. А. Громаковская, Б. М. Широков. Распределение значений функции Жордана в классах вычетов // Чебышевский сборник, 2019, т. 20, вып. 2, с. 123–139.

CHEBYSHEVSKII SBORNIK

Vol. 20. No. 2.

UDC 511.3

DOI 10.22405/2226-8383-2019-20-2-123-139

Distribution of values of Jordan function in residue classes

L. A. Gromakovskaya, B. M. Shirokov

Gromakovskaya Larisa Aleksandrovna — senior lecturer, Petrozavodsk State University (Petrozavodsk).

e-mail: gromak_la@mail.ru

Shirokov Boris Mikhailovich — candidate of physics-mathematical Sciences, associate Professor, Petrozavodsk State University (Petrozavodsk).

e-mail: bmshir@mail.ru

Abstract

The concept of a uniform distribution of integral-valued arithmetic functions in residue classes modulo N was introduced by I. Niven [3]. For multiplicative functions, the concept of a weakly uniform distribution modulo N , which was introduced by V. Narkevich [6], turned out to be more convenient. In papers on the distribution in residue classes, we usually give asymptotic formulas for the number of hits of the values of functions in a particular class containing only the leading terms, which is explained by the application to the generating functions of the Tauberian theorem of H. Delange [12], although these generating functions have better analytical properties, which is necessary for the theorem of H. Delange. In this paper we consider the distribution of values of the Jordan function $J_2(n)$. For a positive integer n , the value of $J_2(n)$ is the number of pairwise incongruent pairs of integers that are primitive modulo n . It is proved that $J_2(n)$ is weakly uniformly distributed modulo N if and only if N is relatively prime to 6. Moreover, the paper contains an asymptotic formula representing an asymptotic series, which is achieved by applying Lemma 3, which is a Tauberian theorem type that replaces the theorem of H. Delange.

Keywords: tauberian theorem, distribution of values, residue classes

Bibliography: 17 titles.

For citation:

L. A. Gromakovskaya, B. M. Shirokov, 2019, "Distribution of values of Jordan function in residue classes", *Chebyshevskii sbornik*, vol. 20, no. 2, pp. 123–139.

1. Введение

Работы, связанные с конгруэнциальными свойствами целочисленных арифметических функций, стали появляться с середины 20 века. В них, как правило, устанавливались асимптотические формулы для количества значений функций, удовлетворяющих некоторым условиям конгруэнтности, в основном, по простому модулю ([1, 2]).

В 1961 году И. Нивен [3] ввел понятие равномерного распределения в классах вычетов по произвольному модулю и в кольце $\mathbb{Z}$. Эта работа положила начало изучению условий наличия равномерного распределения в классах вычетов. Учияма [5] получил критерий равномерного распределения последовательности по заданному модулю и установил двойственность этого понятия понятию равномерного распределения последовательности по модулю 1 (см. также [4, глава V]). В 1967 году В. Наркевич [6] перенес понятие равномерного распределения функций на группу приведенных вычетов по некоторому модулю N и назвал его слабо равномерным распределением (с.р.р.) по модулю N . Это понятие оказалось более удобным для мультипликативных функций. В работах [6, 7] изучается с.р.р. по модулю N для некоторого класса мультипликативных функций.

В статье О. М. Фоменко [8] установлено с.р.р. по простому модулю для некоторых функций, не попадающих в класс В. Наркевича. В работе Б. М. Широкова [9] перенесена теория В. Наркевича на более широкий класс функций, а в [10, 11] приведены необходимые и достаточные условия на модуль N для с.р.р. по модулю N некоторых функций, не попадающих в класс полиномоподобных.

Отметим, что в работах о распределении значений функций в классах вычетов приводятся асимптотические формулы для количества значений функций, попадающих в заданный класс вычетов, которые содержат только главный член асимптотики. Это объясняется тем, что для используемых при этом производящих функций применяется тауберова теорема Деланжа [12]. Но эти производящие функции обладают лучшими аналитическими свойствами, чем необходимо для применения этой теоремы.

Ключевую роль при выводе асимптотических формул в нашей работе играет лемма 3, которая представляет собой теорему тауберова типа и является более точной формой тауберовой теоремы 1 работы [13]. Проф. Е. В. Подсыпанин обратил наше внимание на то, что в этой теореме не отражена зависимость асимптотики в случае нецелого показателя z от числа n , количества слагаемых асимптотики и не ясно, можно ли считать асимптотику асимптотическим рядом. Лемма 3 содержит более точный результат, чем упомянутая выше теорема 1. В ней отражена зависимость асимптотики от n . В связи с этим она приводится с полным доказательством.

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. $N, a, b, d, i, j, k, m, n, r$ — целые числа; p, q — простые числа; x — действительное число, большее 1; $s = \sigma + it$ — комплексное число; $(a_1, \dots, a_k)$ — наибольший общий делитель чисел $a_1, \dots, a_k$; $G(N)$ — группа вычетов, взаимно простых с N ; χ и h — характеры Дирихле по модулю N ; $f(n)$ — мультипликативная целозначная функция; $|M|$ — количество элементов конечного множества M ; $S(x, r, f)$ — количество чисел $n \leq x$, для которых $f(n) \equiv r \pmod N$, или $S(x, r)$, когда из контекста ясно, о какой функции $f(n)$ идет речь; для некоторой постоянной $c_0 > 0$

$$\sigma(t) = \max \left\{ \frac{3}{4}, 1 - \frac{c_0}{\ln(|t| + 2)} \right\}, \quad \Omega = \{s \mid \sigma(t) < \sigma, -\infty < t < +\infty\};$$

$\varphi(n)$ — функция Эйлера; $\Gamma(s)$ — гамма-функция Эйлера;

$$\lambda = \prod_{q|N} \frac{q-3}{q-1}; \quad z(\chi) = \frac{1}{\varphi(N)} \sum_{r \in G(N)} \chi(r^2 - 1).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Функция $f(n)$ называется слабо равномерно распределенной по модулю N , если для любых a и b , взаимно простых с N ,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{S(x, a, f)}{S(x, b, f)} = 1,$$

при условии, что множество $\{n \mid (f(n), N) = 1\}$ бесконечно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Пара чисел a и b называется примитивной по модулю N , если $(a, b, N) = 1$.

Количество несравнимых между собой по модулю n примитивных пар обозначается через $J_2(n)$ и называется функцией Жордана. В дальнейшем будем обозначать ее $J(n)$. Она мультипликативна и

$$J(n) = n^2 \prod_{q|n} \left(1 - \frac{1}{q^2}\right).$$

Свойства этой функции и некоторых ее обобщений изучались в работах [14, 15, 16].

В нашей работе рассматривается распределение значений функции Жордана в классах вычетов по модулю N и доказываются следующие теоремы.

ТЕОРЕМА 1. Функция $J(n)$ слабо равномерно распределена по модулю N тогда и только тогда, когда $(N, 6) = 1$.

ТЕОРЕМА 2. Если $(N, 6) = 1$, то для любого натурального n и для любого $r \in G(N)$ при $x \rightarrow \infty$ для функции $J(n)$ справедлива асимптотика

$$S(x, r) = \frac{1}{\varphi(N)} \frac{x}{(\ln x)^{1-\lambda}} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k(\chi_0)}{\Gamma(k-\lambda) \ln^k x} + \\ + \frac{1}{\varphi(N)} \sum_{\chi \neq \chi_0} \frac{\bar{\chi}(r)x}{(\ln x)^{1-z(\chi)}} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k(\chi)}{\Gamma(k-z(\chi)) \ln^k x} + O\left(\frac{x\Gamma(n+3-\lambda)}{R^n(\ln x)^{n+1-\lambda}}\right),$$

причем, $|z(\chi)| < \lambda$ для любого $\chi \neq \chi_0$, где $a_k(\chi)$ и R , $0 < R < 1$, — постоянные, не зависящие от n , и константа в символе O тоже не зависит от n .

2. Доказательство теоремы 1

Для доказательства теоремы нам потребуются следующие леммы.

ЛЕММА 1. Если $(N, 6) = 1$ и для характера χ по модулю N справедливо равенство

$$\sum_{r \in G(N)} \chi(r^2 - 1) = \varphi(N) \prod_{q|N} \frac{q-3}{q-1}, \quad (1)$$

то χ — главный характер по модулю N .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть сначала $N = q^k$ и $q > 7$. Вычет $r \in G(N)$ представим в виде

$$r = aq + b, \quad 0 \leq a \leq q^{k-1} - 1, \quad 1 \leq b \leq q - 1.$$

Равенство $\chi(r^2 - 1) = 0$ верно тогда и только тогда, когда

$$r^2 - 1 \equiv 0 \pmod{q},$$

т. е. $r^2 \equiv 1 \pmod{q}$. Значит, $r = aq + 1$ или $r = aq + q - 1$, $0 \leq a \leq q^{k-1} - 1$. Количество таких вычетов равно $2q^{k-1}$. Поэтому количество ненулевых слагаемых в сумме, стоящей в равенстве (1), равно

$$\varphi(q^k) - 2q^{k-1} = \varphi(q^k) \frac{q-3}{q-1},$$

т. е. правой части равенства (1) при $N = q^k$. Так как $|\chi(n)| = 1$ при условии, что $\chi(n) \neq 0$, то для ненулевых слагаемых суммы в равенстве (1) имеем: $\chi(r^2 - 1) = 1$. Далее доказательство проведем индукцией по a .

Пусть $a = 0$. Если $r = 2$, то $\chi(1) = \chi(3) = 1$. Вычет $r = 3$ приводит к равенству $\chi^3(2) = 1$. При $r = 7$ получаем $\chi(48) = \chi(3)\chi^4(2) = \chi(2) = 1$.

Итак, $\chi(1) = \chi(2) = 1$. Если для $r < q - 1$ верны равенства $\chi(r-1) = \chi(r) = 1$, то из равенства $\chi(r^2 - 1) = 1$ следует, что $\chi(r+1) = 1$. Таким образом, для всех r , удовлетворяющих неравенству $1 \leq r \leq q - 1$ мы получили $\chi(r) = 1$.

Допустим, что для всех вычетов $r \leq aq + q - 1$, $a < q^{k-1} - 1$ выполняется равенство $\chi(r) = 1$.

Положим $a' = a + 1$. Нам достаточно показать, что

$$\chi(a'q + 1) = \chi(a'q + 2) = 1.$$

Если a' нечетно, то $\frac{a'q+1}{2} \leq aq + q - 1$. Следовательно,

$$\chi(a'q + 1) = \chi(2)\chi\left(\frac{a'q + 1}{2}\right) = 1.$$

Далее, одно из чисел $a'q + 2$, $a'q + 4$, $a'q + 6$ делится на 3. Если это $a'q + 2$, то

$$\chi(a'q + 2) = \chi(3)\chi\left(\frac{a'q + 2}{3}\right) = 1.$$

Если это $a'q + 4$, то аналогично находим, что $\chi(a'q + 4) = 1$. Но

$$\chi(a'q + 2)\chi(a'q + 4) = 1.$$

Значит, и $\chi(a'q + 2) = 1$.

Если это $a'q + 6$, то так же видим, что $\chi(a'q + 4) = 1$, а отсюда и $\chi(a'q + 2) = 1$.

А теперь так же, как и при $a = 0$, индуктивно устанавливаем, что $\chi(a'q + b) = 1$ для всех таких значений b , что $1 \leq b \leq q - 1$.

Если же a' четно, то одно из чисел $a'q + 1$, $a'q + 3$, $a'q + 5$ делится на 3. Тогда рассуждая так же, как выше, получим, что $\chi(a'q + 1) = 1$. В силу четности числа $a'q + 2$, как и прежде, выводим, что $\chi(a'q + 2) = 1$. Опять, повторяя рассуждение при $a = 0$, находим, что $\chi(a'q + b) = 1$ для всех значений b , удовлетворяющих неравенству $1 \leq b \leq q - 1$.

Пусть теперь $q = 5$ или $q = 7$. При $r = 2$ имеем: $2^2 - 1 = 3$ и $\chi(3) = 1$. Но 3 — первообразный корень по модулю q^k . Поэтому $\chi = \chi_0$.

Если $N = q_1^{k_1} \cdots q_l^{k_l}$, $q_i > 3$, то, в силу китайской теоремы об остатках, каждому $r \in G(N)$ взаимно однозначно соответствует такой набор $(r_1, \dots, r_l)$, $r_i \in G(q_i^{k_i})$, что $r \equiv r_i \pmod{q_i^{k_i}}$. Кроме того, характер χ определяется как произведение характеров χ_i групп $G(q_i^{k_i})$. Следовательно,

$$\chi(r^2 - 1) = \chi_1(r_1^2 - 1) \cdots \chi_l(r_l^2 - 1)$$

Подставим это в равенство (1). Обозначая $G_i = G(q_i^{k_i})$ и $N_i = q_i^{k_i}$, получим

$$\sum_{r \in G} \chi_1(r_1^2 - 1) \cdots \chi_l(r_l^2 - 1) = \prod_{i=1}^l \sum_{r_i \in G_i} \chi_i(r_i^2 - 1) = \prod_{i=1}^l \varphi(N_i) \frac{q_i - 3}{q_i - 1}.$$

Как показано выше, для каждой суммы в произведении справедливо неравенство

$$\left| \sum_{r_i \in G_i} \chi_i(r_i^2 - 1) \right| \leq \varphi(N_i) \frac{q_i - 3}{q_i - 1}.$$

Следовательно для каждого i , $1 \leq i \leq l$,

$$\sum_{r_i \in G_i} \chi_i(r_i^2 - 1) = \varphi(N_i) \frac{q_i - 3}{q_i - 1}.$$

По доказанному отсюда следует, что для любого i характер χ_i — главный. Тогда и характер χ тоже главный. Лемма доказана. $\square$

Введем дополнительные обозначения: $R(N, f)$ — множество тех вычетов $r \in G(N)$, для которых существует такое простое число p , $(p, N) = 1$, что $f(p) \equiv r \pmod{N}$; $\Lambda(N, f)$ — подгруппа $G(N)$, порожденная множеством $R(N, f)$. Для функции Жордана положим $R(N) = R(N, J)$ и $\Lambda(N) = \Lambda(N, J)$.

Функция $f(n)$ называется полиномоподобной, если для любого натурального k существует такой многочлен $P_k(x)$ степени k с целыми коэффициентами, что для любого простого числа p $f(p^k) = P_k(p)$.

ЛЕММА 2. Если для полиномоподобной мультипликативной функции $f(n)$ выполняется равенство $\Lambda(N, f) = G(N)$, то функция $f(n)$ слабо равномерно распределена по модулю N .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Эта лемма есть непосредственное следствие теоремы 1 работы В. Наркевича [6, с. 270]. $\square$

Приступим к доказательству теоремы 1.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Итак, пусть $(N, 6) = 1$. Допустим, что $\Lambda(N) \neq G(N)$. Тогда существует неглавный характер χ по модулю N , равный 1 на подгруппе $\Lambda(N)$. Если $r \in G(N)$ и простое число $p \equiv r \pmod{N}$, то $J(p) \equiv r^2 - 1 \pmod{N}$. Значит, множество

$$R(N) = \{a | a \equiv r^2 - 1 \pmod{N}, r \in G(N), (r^2 - 1, N) = 1\}.$$

Так как $R(N) \subset \Lambda(N)$, то

$$\sum_{r \in G(N)} \chi(r^2 - 1) = |R(N)| = \varphi(N) \prod_{q|N} \frac{q-3}{q-1}.$$

Тогда из леммы 1 следует, что χ — главный характер и $\Lambda(N) = G(N)$. В виду леммы 2 функция $J(n)$ с. р. р. по модулю N .

Нам осталось убедиться, что если N делится на 2 или на 3, то функция $J(n)$ не обладает слабо равномерным распределением по этому модулю. Покажем, что в этом случае множество $M = \{n | (J(n), N) = 1\}$ конечно.

1) Пусть N четно.

Если существует $p > 2$, делящее n , то $p^2 - 1 | J(n)$ и $J(n)$ четно и $n \notin M$. Если же $n = 2^m$, то $J(n)$ нечетна только при $m = 0$ или 1, т. е. множество M содержит не больше двух чисел.

2) Пусть N нечетно, но делится на 3.

Если $n = 3^k n_1$ и $(n_1, 3) = 1$, то при $k > 1$ число $J(n)$ делится на 3 и $n \notin M$. Пусть $n = n_1$ или $n = 3n_1$. Если n_1 четно, то в обоих случаях $3 | J(n)$ и $n \notin M$. Если n_1 нечетно и не равно 1, то существует $p \geq 5$, делящее n_1 . Тогда из трех чисел $p-1$, p , $p+1$ одно делится на 3 и это не число p , т. е. $3 | J(n)$ и $n \notin M$. Остается только две возможности: $n = 1$ и $n = 3$, т. е. M конечно.

Таким образом, если $(N, 6) > 1$, то множество M конечно и функция $J(n)$ не обладает с. р. р. по модулю N . Теорема 1 полностью доказана. $\square$

3. Доказательство теоремы 2

Нам потребуется лемма, которая представляет собой теорему тауберова типа для рядов Дирихле. Именно эта лемма заменит теорему Деланжа, о которой шла речь во введении.

ЛЕММА 3. Пусть для арифметической функции $f(n)$ существуют такие постоянные $A > 0$ и $B > 0$, что $|f(n)| \leq B(\ln n)^A$ и определенная при $\sigma > 1$ функция

$$F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n^s}$$

удовлетворяет условиям:

1) существует такая регулярная в Ω и непрерывная на ее границе функция $G(s)$, что при $\sigma > 1$ для некоторого $z \in \mathbb{C}$

$$F(s) = G(s)(s-1)^{-z}, \quad (2)$$

причем, если z — нецелое, то фиксируем главную ветвь $\ln(s-1)$;

2) для продолжения $F(s)$ в области Ω существует такая постоянная $A_1 > 0$, что $F(s) = O(\ln^{A_1}(|t|+2))$, $|t| \geq 1$.

Тогда существует такая постоянная $c \in (0, 1)$, что при $x \rightarrow \infty$

а) если $z = 1, 0, -1, -2, \dots$, то

$$S(x) = \sum_{n \leq x} f(n) = \nu(z)G(1)x + O(xe^{-c\sqrt{\ln x}}),$$

где $\nu(z) = 1$, если $z = 1$ и $\nu(z) = 0$ в противном случае;

б) если $z \notin \mathbb{Z}$ и $\xi = \operatorname{Re} z$, то для любого натурального n

$$S(x) = \frac{x}{(\ln x)^{1-z}} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k}{\ln^k x \Gamma(k-z)} + O\left(\frac{x \Gamma(n+3-\xi)}{R^n (\ln x)^{n+1-\xi}}\right),$$

где a_k — коэффициенты Тейлора функции $G(s)s^{-1}$ в точке $s = 1$, а R — произвольное положительное число, меньшее 1 и радиуса регулярности этой функции в точке $s = 1$, и константы a_k и в символе O не зависят от n .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Обозначим $\ln^{-1} \mathbf{x}$ и $\sigma_0 = 1 + 2$. На основании теоремы П.3.1 в книге К. Прахара [17] существует такая постоянная $B_1 > 0$, что для полуцелого $x > 1$

$$\sum_{n \leq x} f(n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma_0 - iT}^{\sigma_0 + iT} F(s) \frac{x^s}{s} ds + O\left(\frac{x \ln^{B_1} x}{T}\right). \quad (3)$$

Используя продолжение функции $F(s)$ влево от прямой $\sigma = 1$, заменим контур интегрирования.

Пусть $z \leq 1$ — целое число. Опишем дополнительные контуры.

$L_1^+ : \sigma(T) \leq \sigma \leq \sigma_0, t = T, \quad L_1^- : \sigma(T) \leq \sigma \leq \sigma_0, t = -T;$

$L_2^+ : \sigma = \sigma(t), \leq \mathbf{t} \leq \mathbf{T}; \quad L_2^- : \sigma = \sigma(t), -T \leq t \leq -;$

$L_3 : \sigma = \sigma(), |\mathbf{t}| \leq; \quad L = L_1^+ \cup L_2^+ \cup L_3 \cup L_2^- \cup L_1^-.$

Обозначим для некоторого контура Γ

$$I(\Gamma) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} F(s) \frac{x^s}{s} ds.$$

В случае а) функция $F(s)s^{-1}x^s$ либо регулярна в Ω , если $z \leq 0$, либо содержит один простой полюс при $s = 1$, если $z = 1$. Поэтому

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma_0 - iT}^{\sigma_0 + iT} F(s) \frac{x^s}{s} ds = \nu(z)G(1)x + O(|I(L)|). \quad (4)$$

Далее,

$$|I(L_1^+)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\sigma(T)}^{\sigma_0} |F(s)| \frac{x^\sigma}{|\sigma + iT|} d\sigma.$$

Из условия 2) леммы следует, что существует такая постоянная $C_1 > 0$, что при $T = e^{\sqrt{\ln x}}$

$$|I(L_1^+)| \leq C_1 \frac{x \ln^{A_1} T}{T} \int_{\sigma(T)}^{\sigma_0} x^\sigma d\sigma = O((\ln x)^{\frac{A_1}{2}} - 1) x e^{-\sqrt{\ln x}}. \quad (5)$$

Оценка по контуру L_1^- будет такой же, так как интегралы по этим контурам комплексно сопряжены.

Перейдем к оценке $I(L_2^+)$. Пусть $t_0 = \max\{e^{4c_0} - 2, 0\}$. Если $t_0 > 0$ и $0 \leq t \leq t_0$, то $\Delta\sigma(t) = \frac{3}{4}$; если $t \geq t_0$, то $\Delta\sigma(t) = 1 - \frac{c_0}{\ln(t+2)}$. Если $t_0 > 0$, то $\delta < t_0$ при достаточно большом x . Представим $I(L_2^+)$ следующим образом

$$I(L_2^+) = \frac{1}{2\pi} \int_{\delta}^{t_0} \frac{F(3/4 + it)x^{3/4+it}}{3/4 + it} dt + \frac{x}{2\pi} \int_{t_0}^T \frac{F(\sigma(t) + it)}{\sigma(t) + it} x^{it+\sigma(t)-1} dt.$$

В первом интеграле функция $\Delta F\left(\frac{3}{4} + it\right)$ ограничена, поэтому он имеет оценку $O(x^{3/4})$. Во втором — можно считать, что $F(s) = O(\ln^{A_1}(t+2))$ (условие 2) леммы), так как при $|t| \leq 1$ это условие равносильно ограниченности $F(\sigma(t) + it)$, что справедливо. Так что для второго интеграла найдутся такие постоянные $C_2 > 0$ и $C_3 > 0$, что при $T = e^{\sqrt{\ln x}}$ он не превосходит

$$\begin{aligned} C_2 x \int_{t_0}^T \frac{\ln^{A_1}(t+2)}{t+2} x^{-c_0/\ln(T+2)} dt &\leq C_2 x e^{\frac{-c_0 \ln x}{\ln(T+2)}} \frac{(\ln(T+2))^{A_1+1}}{A_1+1} \leq \\ &\leq C_3 x (\ln x)^{A_1+1} e^{-(c_0 \sqrt{\ln x})/2}. \end{aligned}$$

Соединяя полученные две оценки, получим

$$I(L_2^+) = O(x(\ln x)^{A_1+1} e^{-(c_0 \sqrt{\ln x})/2}). \quad (6)$$

Для контура L_3 при $\gamma = \min\left\{\frac{1}{4}, \frac{c_0}{\ln 3}\right\}$ справедлива оценка

$$I(L_3) = O(x^{1-\gamma}),$$

которая поглощается предыдущими, поэтому в дальнейшем ее можно не учитывать. Выберем $c > 0$ так, чтобы $c < 1$ и $c < c_0/2$. Тогда правые части неравенств (5) и (6) оценятся как $O(xe^{-c\sqrt{\ln x}})$. Подставим полученные оценки в формулу (4), затем — в равенство (3) и получим утверждение пункта а) леммы.

Перейдем к доказательству пункта б). Допустим, что z — нецелое число. Теперь при интегрировании по новому контуру мы не должны пересекать полупрямую $t = 0$, $-\infty < \sigma \leq 1$, поэтому в контуре L заменим контур L_3 на контур Γ , состоящий из трех частей:

$$L_4^+ : \sigma(\delta) \leq \sigma \leq 1, \quad t = \delta;$$

$$L_5 : s - 1 = \delta e^{i\varphi}, \quad -\pi/2 \leq \varphi \leq \pi/2;$$

$$L_4^- : \sigma(\delta) \leq \sigma \leq 1, \quad t = -\delta.$$

Обозначим через L' новый контур, заменяющий контур L . Тогда

$$I(L') = I(L_1^+) + I(L_2^+) + I(\Gamma) + I(L_2^-) + I(L_1^-) = I(\Gamma) + O(xe^{-c\sqrt{\ln x}}), \quad (7)$$

так как оценки интегралов по контурам $L_1^\pm, L_2^\pm$ остаются те же, что и в случае 1).

Пусть R' — радиус круга регулярности функции $G(s)$ с центром в точке $s = 1$. Выберем $R < 1$ так, чтобы $0 < R < R'$. Можно считать, что точка $s = \sigma(\delta) + i\delta$ пересечения контуров L_2^+ и L_4^+ находится в круге $|s - 1| < R$. В противном случае добавим контур, лежащий на прямой $t = \delta$, от этой точки до точки $\sigma' + i\delta$, лежащей в левом полукруге $|s - 1| < R$, причем интеграл по этому контуру оценится как $O(x^{\sigma'})$, $\sigma' < 1$.

Итак, контур Γ находится внутри круга $|s-1| \leq R$, в котором функция $G(s)s^{-1}$ регуляльна. Выберем произвольно натуральное число $n \geq 1$. Пусть a_k и $R_n(s)$ — коэффициенты и остаточный член в формуле Тейлора для функции $G(s)s^{-1}$ в круге $|s-1| < R$. Для интеграла по контуру Γ получим представление

$$I(\Gamma) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=0}^{n-1} a_k \int_{\Gamma} (s-1)^{k-z} x^s ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{x^s R_n(s)}{(s-1)^z} ds. \quad (8)$$

В интегралах под знаком суммы контур Γ дополним двумя контурами

$$\Gamma_{\delta}^{+}: -\infty < \sigma \leq \sigma(\delta), \quad t = \delta; \quad \Gamma_{\delta}^{-}: -\infty < \sigma \leq \sigma(\delta), \quad t = -\delta.$$

Обозначим $H_{\delta} = \Gamma_{\delta}^{+} \cup \Gamma \cup \Gamma_{\delta}^{-}$. Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} (s-1)^{k-z} x^s ds = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{H_{\delta}} - \int_{\Gamma_{\delta}^{+}} - \int_{\Gamma_{\delta}^{-}} \right) (s-1)^{k-z} x^s ds. \quad (9)$$

В интеграле по H_{δ} используем преобразование $s-1 = \delta\zeta$ и обозначим через H контур, в который переходит контур H_{δ} . Благодаря представлению Ханкеля для Γ -функции, получим

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{H_{\delta}} (s-1)^{k-z} x^s ds = \frac{x\delta^{k+1-z}}{2\pi i} \int_H \zeta^{k-z} e^{\zeta} d\zeta = \frac{x}{(\ln x)^{k+1-z}} \cdot \frac{1}{\Gamma(z-k)}.$$

Оценим интеграл по контуру Γ_{δ}^{+} , обозначая его величину через I_k :

$$I_k = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta}^{+}} (s-1)^{k-z} x^s ds \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\sigma(\delta)} |(\sigma-1+i\delta)^{k-z}| x^{\sigma} d\sigma. \quad (10)$$

Пусть $z = \xi + i\eta$. Ввиду закрепления главной ветви $\ln(s-1)$ на Γ_{δ}^{+} , с некоторой постоянной $C_4 > 0$ справедливо неравенство

$$|(s-1)^{-z}| = |s-1|^{-\xi} e^{\eta \arg(s-1)} \leq C_4 |s-1|^{-\xi}. \quad (11)$$

В последнем интеграле положим $1-\sigma = \delta u$. Тогда

$$I_k \leq \frac{C_4 x}{2\pi} \delta^{k+1-\xi} \int_{(1-\sigma(\delta))/\delta}^{\infty} e^{-u} (u+1)^{k-\xi} du.$$

По определению $\sigma(t)$

$$1-\sigma(\delta) = \min \left\{ \frac{1}{4}, \frac{c_0}{\ln(2+\delta)} \right\} \geq \min \left\{ \frac{1}{4}, \frac{c_0}{\ln 3} \right\} \stackrel{Def}{=} \varepsilon.$$

Так как $\delta = (\ln x)^{-1}$, то $(1-\sigma(\delta))/\delta \geq \varepsilon \ln x$. Следовательно,

$$I_k \leq \frac{C_4}{2\pi} \delta^{k+1-\xi} x \int_{\varepsilon \ln x}^{\infty} e^{-u} (u+1)^{k-\xi} du.$$

С некоторыми положительными постоянными c' и c'' в этом интеграле справедливо неравенство $c'u \leq u + 1 \leq c''u$. Поэтому найдется такая постоянная $C_5 > 0$, что

$$I_k \leq \frac{C_5 x}{(\ln x)^{k+1-\xi}} \int_{\varepsilon \ln x}^{\infty} u^{k-\xi} e^{-u} du.$$

Пусть $[\xi] = m$, $\xi = m + \alpha$ и $l = k - m$. Так как $0 \leq k \leq n - 1$, то $-m \leq l \leq n - m - 1$. Если $l \leq 0$, то

$$I_k = I_{l+m} \leq \frac{C_5 x}{(\ln x)^{k+1-\xi}} \int_{\varepsilon \ln x}^{\infty} u^{l-\alpha} e^{-u} du \leq \frac{C_5 x^{1-\varepsilon}}{\ln x}. \quad (12)$$

Если $l > 0$, то

$$\int_{\varepsilon \ln x}^{\infty} u^{l-\alpha} e^{-u} du \leq \frac{x^{-\varepsilon}}{(\varepsilon \ln x)^{\alpha}} (l+1)! (\ln x)^l.$$

С некоторой постоянной $C_6 > 0$ это приводит к оценке

$$I_k = I_{l+m} \leq C_6 \frac{x^{1-\varepsilon}}{\ln x} (l+1)!. \quad (13)$$

Оценка по контуру Γ_{δ}^{-} будет такой же. Пусть $\Delta M = \max_{|s-1|=R} |G(s)s^{-1}|$. Тогда $|a_k| \leq MR^{-k}$. Из формул (10), (12) и (13) с некоторой постоянной $C_7 > 0$ следует

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=0}^{n-1} a_k \left(\int_{\Gamma_{\delta}^{+}} + \int_{\Gamma_{\delta}^{-}} \right) (s-1)^{k-z} x^s ds \right| &\leq C_7 \frac{x^{1-\varepsilon}}{\ln x} \sum_{k=m}^{n-1} \frac{(k-m+1)!}{R^k} \leq \\ &\leq C_7 \frac{x^{1-\varepsilon}}{\ln x} \cdot \frac{(n-m)(n-m)!}{R^n} \leq C_7 \frac{x^{1-\varepsilon}}{\ln x} \cdot \frac{\Gamma(n+3-\xi)}{R^n}. \end{aligned} \quad (14)$$

Нам осталось оценить интеграл от остаточного члена $R_n(s)$, который будем рассматривать как остаток ряда Тейлора. Его коэффициенты удовлетворяют неравенству $|a_k| \leq MR^{-k}$. Следовательно,

$$|R_n(s)| \leq \frac{M|s-1|^n}{R^n} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|s-1|^k}{R^k}.$$

Так как контур Γ целиком лежит внутри круга $|s-1| = R$, то существует такое положительное число $\rho < R$, что для $s \in \Gamma$ справедливо неравенство $|s-1| \leq \rho$. Поэтому с некоторой положительной постоянной C_8 имеем:

$$|R_n(s)| \leq C_8 \frac{|s-1|^n}{R^n}.$$

Учитывая, что неравенство (11) справедливо и для контура Γ , с некоторой постоянной $C_9 > 0$ получим

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{L_4^{+}} R_n(s) x^s (s-1)^{-z} ds \right| \leq C_9 \frac{\delta^{n+1-\xi}}{R^n} \int_0^{\infty} e^{-u} u^{n-\xi} du = C_9 \frac{\Gamma(n+1-\xi)}{(\ln x)^{n+1-\xi} R^n} \quad (15)$$

Оценка по контуру L_4^{-} такая же.

На контуре L_5 : $s-1 = \delta e^{i\varphi}$; поэтому $|(s-1)^{-\xi-i\eta}| = \delta^{-\xi} e^{\varphi\eta} \leq \delta^{-\xi} e^{\pi|\eta|}$; $R_n(s) = O(\delta^n) R^{-n}$; величина x^{s-1} ограничена. С некоторой постоянной $C_{10} > 0$ справедливо неравенство

$$\left| \int_{L_5} R_n(s) (s-1)^{-z} x^s ds \right| \leq C_{10} x \delta^{n+1-\xi} R^{-n}. \quad (16)$$

Из равенств (8) и (9) и оценок (14), (15) и (16) получаем

$$I(\Gamma) = \frac{x}{(\ln x)^{1-z}} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k}{(\ln x)^k \Gamma(z-k)} + O\left(\frac{x \Gamma(n+3-\xi)}{(\ln x)^{n+1-\xi} R^n}\right).$$

Из этого равенства и формул (3), (7) и (8) следует второе утверждение леммы. Лемма доказана. $\square$

Перейдем к доказательству теоремы 2.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть N — фиксированное натуральное число, взаимно простое с 6. Используя свойство ортогональности характеров, представим сумму $S(x, r)$ в виде

$$S(x, r) = \sum_{\substack{n \leq x \\ J(n) \equiv r \pmod{N}}} 1 = \frac{1}{\varphi(N)} \sum_{\chi} \bar{\chi}(r) \sum_{n \leq x} \chi(J(n)).$$

Обозначим

$$S(x, \chi) = \sum_{n \leq x} \chi(J(n)).$$

Это сумматорная функция для коэффициентов ряда

$$F(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(J(n))}{n^s}. \quad (17)$$

Таким образом, задача свелась к применению леммы 3 к ряду Дирихле (17). Для применения леммы нужно изучить аналитические свойства функции $F(s, \chi)$ и ее аналитического продолжения в области Ω .

Функция $\chi(J(n))$ мультипликативна, а ряд (17) абсолютно сходится при $\sigma > 1$, поэтому

$$F(s, \chi) = \prod_p \left(1 + \frac{\chi(J(p))}{p^s} + \frac{\chi(J(p^2))}{p^{2s}} + \dots \right).$$

Так как $\chi(J(p^k)) = \chi(p^{2k-2}(p^2-1)) = \chi(p^2-1) \chi^{2k-2}(p)$, то

$$F(s, \chi) = \prod_p \left(1 + \frac{\chi(p^2-1)}{p^s - \chi^2(p)} \right).$$

Обозначим

$$H(s, \chi) = \prod_{(p, N)=1} \left(1 - \frac{\chi(p^2-1)}{p^s} \right)^{-1}.$$

Умножим и разделим $F(s, \chi)$ на $H(s, \chi)$ и представим в виде

$$F(s, \chi) = A(s, \chi) H(s, \chi).$$

Через $A(s, \chi)$ обозначена функция

$$A(s, \chi) = \left(1 + \frac{\chi(3)(\chi^2(2) - \chi(3))}{2^s(2^s - \chi^2(2))}\right) \prod_{p|N} \left(1 + \frac{\chi(p^2 - 1)}{p^s}\right) \times \\ \times \prod_{\substack{(p, N)=1 \\ p > 2}} \left(1 + \frac{\chi(p^2 - 1)(\chi^2(p) - \chi(p^2 - 1))}{p^s(p^s - \chi^2(p))}\right).$$

Функция $A(s, \chi)$ регулярна и ограничена при $\sigma \geq 3/4$. Для конечного произведения по простым числам, делящим N , и $p = 2$ это ясно. Проверим это для произведения по всем $p > 2$, не делящим N . В виду неравенства

$$\left| \frac{\chi(p^2 - 1)(\chi^2(p) - \chi(p^2 - 1))}{p^s(p^s - \chi^2(p))} \right| \leq \frac{2}{p^\sigma(p^\sigma - 1)} \leq \frac{4}{p^{3/2}},$$

это произведение сходится абсолютно и равномерно в указанной области, а его значение ограничено. Таким образом, чтобы продолжить $F(s, \chi)$ в область Ω , нужно найти продолжение $H(s, \chi)$. Для этого рассмотрим $\text{Ln } H(s, \chi)$, выбирая ту ветвь, для которой при $\sigma > 1$ справедливо равенство

$$\ln H(s, \chi) = - \sum_{(p, N)=1} \ln \left(1 - \frac{\chi(p^2 - 1)}{p^s}\right).$$

Равенство будет верно, если при $z_p = \chi(p^2 - 1)p^{-s}$ абсолютно сходятся ряды

$$\sum_{(p, N)=1} \ln |1 - z_p| \quad \text{и} \quad \sum_{(p, N)=1} \arg(1 - z_p).$$

Первый ряд абсолютно сходится в виду оценки

$$|\ln |1 - z_p|| \leq \frac{|z_p|}{1 - |z_p|} \leq \frac{1}{p^\sigma - 1}.$$

Так как $|z_p| \leq p^{-\sigma}$, то выбираем ту ветвь, для которой справедливо неравенство

$$|\arg(1 - z_p)| \leq \arctg \frac{|z_p|}{|1 + z_p|} \leq |z_p| \leq \frac{1}{p^\sigma}.$$

Для выбранной ветви

$$\ln H(s, \chi) = \sum_{(p, N)=1} \frac{\chi(p^2 - 1)}{p^s} + \sum_{(p, N)=1} \sum_{k \geq 2} \frac{\chi^k(p^2 - 1)}{kp^{ks}}. \quad (18)$$

Обозначим второе слагаемое в формуле (18) через $B(s, \chi)$. Эта функция регулярна и ограничена в области $\sigma \geq 3/4$. Это следует из неравенства

$$\left| \sum_{k \geq 2} \frac{\chi^k(p^2 - 1)}{kp^{ks}} \right| \leq \frac{1}{p^\sigma(p^\sigma - 1)} \leq 2p^{-3/2}.$$

Преобразуем первое слагаемое в равенстве (18) следующим образом

$$\sum_{(p, N)=1} \frac{\chi(p^2 - 1)}{p^s} = \sum_{r \in G(N)} \chi(r^2 - 1) \sum_{p \equiv r \pmod{N}} p^{-s} = \\ = \sum_{h \bmod N} \frac{1}{\varphi(N)} \sum_{r \in G(N)} \chi(r^2 - 1) \bar{h}(r) \sum_p \frac{h(p)}{p^s}.$$

Ряд по простым числам свяжем с L -функцией $L(s, h)$ с помощью равенства

$$\ln L(s, h) = \sum_p \frac{h(p)}{p^s} + \sum_p \sum_{k \geq 2} \frac{h^k(p)}{kp^{ks}},$$

где ветвь логарифма выбирается аналогично тому, как это сделано на с. 134. Обозначим

$$C(s, h) = - \sum_p \sum_{k \geq 2} \frac{h^k(p)}{kp^{ks}} \quad \text{и} \quad z(\chi, h) = \frac{1}{\varphi(N)} \sum_{r \in G(N)} \chi(r^2 - 1) \bar{h}(r).$$

Функция $C(s, h)$ так же, как и $B(s, \chi)$, регулярна и ограничена в области Ω . Тогда из равенства (18) получим

$$\ln H(s, \chi) = B(s, \chi) + \sum_{h \bmod N} z(\chi, h) (\ln L(s, h) + C(s, \chi)).$$

Отсюда приходим к представлению для $H(s, \chi)$:

$$H(s, \chi) = e^{B(s, \chi)} \prod_{h \bmod N} (L(s, h) e^{C(s, h)})^{z(\chi, h)}.$$

Следовательно, для $F(s, \chi)$ имеем:

$$F(s, \chi) = A(s, \chi) e^{B(s, \chi)} \prod_h e^{z(\chi, h) C(s, h)} \cdot \prod_h (L(s, h))^{z(\chi, h)}. \quad (19)$$

Так как $|z(\chi, h)| \leq 1$, то множитель

$$A(s, \chi) e^{B(s, \chi)} \prod_h e^{z(\chi, h) C(s, h)},$$

как показано выше, есть регулярная и ограниченная при $\sigma \geq 3/4$ функция. Произведение L -функций по характерам h в равенстве (19) запишем в виде

$$(s-1)^{-z(\chi)} (L(s, h_0)(s-1))^{z(\chi)} \prod_{h \neq h_0} (L(s, h))^{z(\chi, h)},$$

где $z(\chi) = z(\chi, h_0)$. Функция $(s-1)L(s, h_0)$ регулярна в области Ω и не обращается там в 0. В произведение по характерам $h \neq h_0$ входят L -функции, которые регулярны в области Ω и, если $h^2 \neq h_0$, то и не обращаются там в 0. Возможный для вещественного характера так называемый зигелевский нуль можем считать лежащим вне области Ω , так как модуль характеров h фиксирован, и на основании теоремы Зигеля уменьшением постоянной c_0 можно отодвинуть границу области Ω правее этого нуля.

Так как выбор ветви $\ln L(s, h)$ уже сделан на с. 135, то для каждого $h \neq h_0$ функция $(L(s, h))^{z(\chi, h)}$ также регулярна в области Ω .

Итак, функция

$$\begin{aligned} G(s, \chi) &= \\ &= A(s, \chi) e^{B(s, \chi)} \prod_h e^{z(\chi, h) C(s, h)} \cdot (L(s, h_0)(s-1))^{z(\chi)} \prod_{h \neq h_0} (L(s, h))^{z(\chi, h)} \end{aligned}$$

регулярна в области Ω . При помощи равенства

$$F(s, \chi) = \frac{G(s, \chi)}{(s-1)^{z(\chi)}}$$

функция $F(s, \chi)$ продолжается аналитически в область Ω , причем для $\ln(s-1)$ закреплена главная ветвь.

Покажем, что $F(s, \chi)$ удовлетворяет условию 2) леммы 3. Для этого используем представление $F(s, \chi)$ равенством (19). Произведение

$$A(s, \chi) e^{B(s, \chi)} \prod_h e^{z(\chi, h) C(s, h)}$$

ограничено на всей области Ω . Для L -функций $L(s, h)$ в области Ω при $|t| \geq 1$ справедлива оценка $L(s, h) = O(\ln(|t| + 2))$ [17, Глава IV]. Обозначим $\tau = \arg L(s, h)$. В виду выбора ветви $\ln L(s, h)$ на с. 135, величина τ ограничена. Если положим $z(\chi, h) = \xi + i\eta$, то

$$\left| (L(s, h))^{z(\chi, h)} \right| = |L(s, h)|^\xi e^{-\tau\eta}.$$

Если $\xi > 0$, то при $|t| \geq 1$

$$(L(s, h))^{z(\chi, h)} = O(\ln(|t| + 2)).$$

Если $\xi < 0$, то нужна оценка $L^{-1}(s, h) = O(\ln^B |t| + 2)$ с некоторой постоянной $B > 0$. Для $h = h_0$ она следует из такой же оценки для $\zeta^{-1}(s)$ [17, с. 83]. Если $h \neq h_0$ то она доказывается аналогично.

Таким образом, $F(s, \chi)$ удовлетворяет условию 2) леммы 3. Для каждого характера χ к функции $F(s, \chi)$ применяем лемму 3 с показателем $z = z(\chi)$. Для главного характера этот показатель $z(\chi_0) = \lambda$. Если $\chi \neq \chi_0$, то, в силу леммы 1, $|z(\chi)| < \lambda$, а тогда и его действительная часть $\xi(\chi) \in (-\lambda, \lambda)$. Обозначая через $a_k(\chi)$ коэффициенты ряда Тейлора функции $G(s, \chi)s^{-1}$ в точке $s = 1$, с некоторым числом R , $0 < R < 1$, получим

$$S(x, \chi) = \frac{x}{(\ln x)^{1-z(\chi)}} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k(\chi)}{\Gamma(k - z(\chi)) \ln^k x} + O\left(\frac{\Gamma(n+3-\xi(\chi))x}{R^n (\ln x)^{n+1-\xi(\chi)}}\right).$$

Подставим величины $S(x, \chi)$ в формулу

$$S(x, r) = \frac{1}{\varphi(N)} \sum_{\chi} \bar{\chi}(r) S(x, \chi).$$

Из $\varphi(N)$ входящих в правую часть остатков выберем один с показателем λ . Так как $(\ln x)^{\xi(\chi)} = O((\ln x)^\lambda)$, то, выделяя слагаемое с $\chi = \chi_0$, получим

$$\begin{aligned} S(x, r) &= \frac{1}{\varphi(N)} \frac{x}{(\ln x)^{1-\lambda}} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k(\chi_0)}{\Gamma(k - \lambda) \ln^k x} + \\ &+ \frac{1}{\varphi(N)} \sum_{\chi \neq \chi_0} \bar{\chi}(r) \frac{x}{(\ln x)^{1-z(\chi)}} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k(\chi)}{\Gamma(k - z(\chi)) \ln^k x} + O\left(\frac{\Gamma(n+3-\lambda)x}{R^n (\ln x)^{n+1-\lambda}}\right). \end{aligned}$$

Доказательство теоремы 2 завершено. $\square$

4. Заключение

Приведенная в работе теорема 2 показывает, что производящие функции, с помощью которых выводятся асимптотические формулы для распределения значений функций в классах вычетов, обладают свойствами, позволяющими получать более точные асимптотические

формулы, чем при применении теоремы Деланжа. Например, в работе В. Наркевича [6] для функции Эйлера $\varphi(n)$ доказывается утверждение:

Если N взаимно просто с b , то при $x \rightarrow \infty$ с некоторой постоянной C

$$S(x, r, \varphi) \sim \frac{Cx}{(\ln x)^{1-\lambda}},$$

где

$$\lambda = \prod_{q|N} \frac{q-2}{q-1}.$$

Этот результат может быть усилен при более детальном изучении соответствующей производящей функции. Пусть

$$z(\chi) = (-\chi(-1))^{\omega(N)} \prod_{q|N} (q-1)^{-1},$$

где $\omega(n)$ — количество простых делителей n без учета кратности. Можно доказать, что

если $(N, 6) = 1$, то при $x \rightarrow \infty$ с некоторыми постоянными C и $C(\chi)$ справедливо следующее равенство

$$S(x, r, \varphi) = \frac{Cx}{\ln^{1-\lambda} x} + \sum_{\chi \neq \chi_0} \frac{C(\chi)x}{(\ln x)^{1-z(\chi)}} + O\left(\frac{x}{(\ln x)^{2-\lambda}}\right).$$

Это равенство дает лемма 3 при выборе $n = 1$. Но можно выбрать любое $n \geq 1$ и получить более точное равенство.

Такому же уточнению могут быть подвергнуты все асимптотические формулы, встречающиеся в работах [1, 2, 6, 8].

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sathe L. G. On a congruence property of the divisor functions // Amer. J. Math. 1945. V. 67. P. 397–406.
2. Rankin R. A. The distribution of divisor functions // Proc. Glasgow Math. Assoc. 1961. V. 5. No 1. P. 35–40.
3. Niven I. Uniform distribution of sequences of integers // Trans. Amer. Math. Soc. 1961. V. 98. P. 52–61.
4. Kuipers L., Niederreiter H. Uniform distribution of sequences. New-York: Wiley-Interscience, 1974. Русский перевод: Кейперс Л., Нидеррейтер Г. Равномерное распределение последовательностей. М.: Наука, 1985.
5. Uchiyama S. On the uniform distribution of sequences of integer // Proc. Japan Acad. 1961. V. 37. P. 605–609.
6. Narkiewicz W. On distribution of values of multiplicative functions in residue classes // Acta Arithm. 1967. V. 12. No 3. P. 269–279.
7. Šliva J. On distribution of values of $\sigma(n)$ in residue classes // Colloq. Math. 1973. V. 27. No 2. P. 283–271.

8. Фоменко О. М. Распределение значений мультипликативных функции по простому модулю // Записки науч. сем. ЛОМИ. 1980. Т. 93. С. 218–224.
9. Широков Б. М. Распределение значений арифметических функций в классах вычетов // Записки науч. сем. ЛОМИ. 1983. Т. 121. С. 176–186.
10. Широков Б. М. Распределение $d(n, \omega)$ в классах вычетов // Труды ПетрГУ. Серия математика. 1995. Вып. 2. С. 136–144.
11. Широков Б. М. Распределение значений обобщенной суммы делителей // Труды ПетрГУ. Серия математика. 1996. Вып. 3. С. 176–189.
12. Delange H. Sur la distribution des entiers ayant certaines proprietes // Ann. Sci. Ecole norm. super. 1956. V. 73. No 1. P. 15–74.
13. Shirokov B. M., Gromakovskaya L. A. Distribution of values of the sum of unitary division in residue classes // Issues of Analysis. 2016. V. 5(23). No 1. P. 31–44.
14. Sandor J. Note on Jordan's arithmetical function // Octagon Math. Mag. 1993. V. 1. P. 1–4.
15. Shulte J. Uber die Jordansche Verallgemeinerung der Eulerschen Funktion // Resultate der Mathematik. 1999. V. 36. No. 3/4. P. 354–364.
16. Andrica D., Piticary M. On some extensions of Jordan arithmetic Functions // Acta. Univ. Apulensis Math. Inform. 2004. V. 7. P. 13–22.
17. Прахар К. Распределение простых чисел. М.: Мир, 1967.

REFERENCES

1. Sathe, L. G. 1945, "On a congruence property of the divisor functions *Amer. J. Math.*, V. 67, pp. 397–406.
2. Rankin, R. A. 1961, "The distribution of divisor functions *Proc. Glasgow Math. Assoc.*, V. 5, No 1, pp. 35–40.
3. Niven, I. 1961, "Uniform distribution of sequences of integers *Trans. Amer. Math. Soc.*, V. 98, pp. 52–61.
4. Kuipers, L., Niederreiter, H. 1974, *Uniform distribution of sequences*. Wiley-Interscience, New-York, 390 pp.
5. Uchiyama, S. 1961, "On the uniform distribution of sequences of integer *Proc. Japan Acad.*, V. 37, pp. 605–609.
6. Narkiewicz, W. 1967, "On distribution of values of multiplicative functions in residue classes *Acta Arithm.*, V. 12, No 3, pp. 269–279.
7. Šliva, J. 1973, "On distribution of values of $\sigma(n)$ in residue classes *Colloq. Math.*, V. 27, No 2, pp. 283–271.
8. Fomenko, O. M. 1980, "Distribution of values of the multiplicative functions prime modulo" ["Распределение значений мультипликативных функций по простому модулю"], *Zapisky nauch. sem. LOMI*, V. 93, pp. 218–224.

9. Shirokov, B. M. 1983, "Distribution of values arithmetical functiones in residue classes" ["Распределение значений арифметических функций в классах вычетов"], *Zapisky nauch. sem. LOMI*, V. 121, pp. 176–186.
10. Shirokov, B. M. 1995, "Distribution of $d(n, \omega)$ in residue classes" ["Распределение $d(n, \omega)$ в классах вычетов"], *Tudy PetrSU. Ser. Math.*, Issue 2, pp. 136–144.
11. Shirokov, B. M. 1996, "Distribution of values of the extended sum of divisors" ["Распределение значений обобщенной суммы делителей"], *Tudy PetrSU. Ser. Mathematic.*, Issue 3, pp. 176–189.
12. Delange, H. 1956, "Sur la distribution des entiers ayant certaines proprietes", *Ann. Sci. Ecole norm. super.*, V. 73, No 1, pp. 15–74.
13. Shirokov, B. M., Gromakovskaya, L. A. 2016, "Distribution of values of the sum of unitary division in residue classes", *Issues of Analysis*, V. 5(23), No 1, pp. 31–44.
14. Sandor, J. 1993, "Note on Jordan's arithmetical function", *Octagon Math. Mag.*, V. 1, pp. 1–4.
15. Shulte, J. 1999, "Uber die Jordansche Verallgemeinerung der Eulerschen Funktion", *Resultate der Mathematik*, V. 36, No. 3/4, pp. 354–364.
16. Andrica, D., Piticary, M. 2004, "On some extensions of Jordan arithmetic Functions", *Acta. Univ. Apulensis Math. Inform.*, V. 7, pp. 13–22.
17. Prachar, K., 1967, "Распределение простых чисел.", (russian) [Distribution of prime numbers] Translated from Deutsch by A. A. Karacuba. Edited by A. I. Vinogradov. With two supplements by M. B. Barban and A. I. Vinogradov, and N. M. Korobov *Izdat. "Mir"*, Moscow 512 pp.

Получено 7.12.2017 г.

Принято в печать 12.07.2019 г.