ЧЕБЫШЕВСКИЙ СБОРНИК

Том 22. Выпуск 1.

УДК 512.548

DOI 10.22405/2226-8383-2021-22-1-353-369

Эндоморфизмы полугрупп

Н. А. Щучкин

Николай Алексеевич Щучкин — кандидат физико-математических наук, Волгоградский государственный социально-педагогический университет (г. Волгоград).

e-mail: nikolaj_shchuchkin@mail.ru

Аннотация

Одной из основных проблем для полугрупп является нахождение $(n, 2)$ -почтиколец, которые изоморфны $(n, 2)$ -почтикольцам эндоморфизмов некоторых полугрупп. Такие $(n, 2)$ -почтикольца найдены для полугрупп.

На аддитивной группе целых чисел Z строим абелеву n -группу $\langle Z, f_1 \rangle$ с n -арной операцией $f_1(z_1, \dots, z_n) = z_1 + \dots + z_n + l$, где l — любое целое число. Для не тождественного автоморфизма $\varphi(z) = -z$ на Z можно задать полугруппу $\langle Z, f_2 \rangle$ для $n = 2k + 1$, $k \in N$, с n -арной операцией $f_2(z_1, \dots, z_n) = z_1 - z_2 + \dots + z_{2k-1} - z_{2k} + z_{2k+1}$. Любая бесконечная полугруппа изоморфна n -группе $\langle Z, f_1 \rangle$, где $0 \leq l \leq [\frac{n-1}{2}]$, либо n -группе $\langle Z, f_2 \rangle$ для нечетных n . В первом случае будем говорить, что такая n -группа имеет тип $(\infty, 1, l)$, а во втором случае — имеет тип $(\infty, -1, 0)$.

В Z выделим множество $P = \{m | ml \equiv 1 \pmod{n-1}\}$ и на нем определим n -арную операцию h по правилу $h(m_1, \dots, m_n) = m_1 + \dots + m_n$. Тогда алгебра $\langle P, h, \cdot \rangle$, где $\cdot$ — умножение целых чисел, будет $(n, 2)$ -кольцом. Доказано, что $\langle P, h, \cdot \rangle$ изоморфно $(n, 2)$ -кольцу эндоморфизмов полугруппы типа $(\infty, 1, l)$.

В n -группе $\langle Z \times Z, h \rangle = \langle Z, f_2 \rangle \times \langle Z, f_2 \rangle$ определим бинарную операцию $\diamond$ по правилу $(m_1, u_1) \diamond (m_2, u_2) = (m_1 m_2, m_1 u_2 + u_1)$. Тогда $\langle Z \times Z, h, \diamond \rangle$ будет $(n, 2)$ -почтикольцом. Доказано, что $\langle Z \times Z, h, \diamond \rangle$ изоморфно $(n, 2)$ -почтикольцу эндоморфизмов полугруппы типа $(\infty, -1, 0)$.

Доказано, что $(n, 2)$ -кольцо $\langle Z, f, * \rangle$, где $f(z_1, \dots, z_n) = z_1 + \dots + z_n + 1$ и $z_1 * z_2 = z_1 z_2 (n-1) + z_1 + z_2$, изоморфно $(n, 2)$ -кольцу эндоморфизмов бесконечной циклической n -группы.

На аддитивной группе кольца классов вычетов Z_k определим n -группу $\langle Z_k, f_3 \rangle$, где n -арная операция f_3 действует по правилу $f_3(z_1, \dots, z_n) = z_1 + m z_2 + \dots + m^{n-2} z_{n-1} + z_n + l$, $1 \leq m < k$ и m взаимно прост с k . Кроме того, m удовлетворяет сравнению $lm \equiv 1 \pmod{k}$ и показатель числа m по модулю k делит $n-1$. Любая конечная полугруппа порядка k изоморфна n -группе $\langle Z_k, f_3 \rangle$, где $l \mid \text{НОД}(n-1, k)$ при $m = 1$ и $l \mid \text{НОД}(\frac{m^{n-1}-1}{m-1}, k)$ при $m \neq 1$. Будем говорить, что такая n -группа имеет тип (k, m, l) .

В n -группе $\langle P, h \rangle = \langle Z_k, f_3 \rangle \times \langle Z_l, f_4 \rangle$, где $f_4(z_1, \dots, z_n) = z_1 + r z_2 + \dots + r^{n-2} z_{n-1} + z_n$, r — остаток от деления m на l , определим бинарную операцию $\diamond$ по правилу

$$(u_1, v_1) \diamond (u_2, v_2) = (u_2 s_1 + u_1, v_2 s_1 + v_1)$$

где $s_1 \in Z_k$ и $s_1 - 1 = s_0 + v_1 \frac{k}{l}$, где s_0 — решение сравнения $x \equiv \frac{(n-1)u_1}{l} \pmod{\frac{k}{l}}$ при $m = 1$ и $x \equiv \frac{\frac{m^{n-1}-1}{m-1} u_1}{l} \pmod{\frac{k}{l}}$ при $m \neq 1$. Доказано, что алгебра $\langle P, h, \diamond \rangle$ будет $(n, 2)$ -кольцом при $m = 1$ и $(n, 2)$ -почтикольцом при $m \neq 1$, которое изоморфно $(n, 2)$ -кольцу эндоморфизмов абелевой полугруппы типа $(k, 1, l)$ при $m = 1$ и $(n, 2)$ -почтикольцу эндоморфизмов полугруппы типа (k, m, l) при $m \neq 1$.

Доказано, что $(n, 2)$ -кольцо $\langle Z_k, f, * \rangle$, где $f(z_1, \dots, z_n) = z_1 + \dots + z_n + 1$ и $u_1 * u_2 = u_1 \cdot u_2 \cdot (n-1) + u_1 + u_2$, изоморфно $(n, 2)$ -кольцу эндоморфизмов конечной циклической n -группы порядка k .

Ключевые слова: n -группа, $(n, 2)$ -кольцо, $(n, 2)$ -почтикольцо, эндоморфизм.

Библиография: 15 названий.

Для цитирования:

Н. А. Щучкин. Эндоморфизмы полугрупповых n -групп // Чебышевский сборник, 2021, т. 22, вып. 1, с. 353–369.

CHEBYSHEVSKII SBORNIK

Vol. 22. No. 1.

UDC 512.548

DOI 10.22405/2226-8383-2021-22-1-353-369

Endomorphisms of semicyclic n -groups

N. A. Shchuchkin

Nikolay Alekseevich Shchuchkin — candidate of physical and mathematical sciences, Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd).

e-mail: nikolaj_shchuchkin@mail.ru

Abstract

One of the main problems for semiabelian n -groups is the finding of $(n, 2)$ -nearrings, which are isomorphic to $(n, 2)$ -nearrings of endomorphisms of certain semiabelian n -groups. Such almost $(n, 2)$ -nearrings are found for semicyclic n -groups.

On the additive group of integers Z we construct an abelian n -group $\langle Z, f_1 \rangle$ with n -ary operation $f_1(z_1, \dots, z_n) = z_1 + \dots + z_n + l$, where l is any integer. For a nonidentical automorphism $\varphi(z) = -z$ on Z , we can specify semiabelian n -group $\langle Z, f_2 \rangle$ for $n = 2k + 1$, $k \in N$, with the n -ary operation $f_2(z_1, \dots, z_n) = z_1 - z_2 + \dots + z_{2k-1} - z_{2k} + z_{2k+1}$. Any infinite semicyclic n -group is isomorphic to either the n -group $\langle Z, f_1 \rangle$, where $0 \leq l \leq [\frac{n-1}{2}]$, or the n -group $\langle Z, f_2 \rangle$ for odd n . In the first case we will say that such n -group has type $(\infty, 1, l)$, and in the second case, it has type $(\infty, -1, 0)$.

In Z we select the set $P = \{m | ml \equiv 1 \pmod{n-1}\}$ and define an n -ary operation h by the rule $h(m_1, \dots, m_n) = m_1 + \dots + m_n$ on this set. Then the algebra $\langle P, h, \cdot \rangle$, where $\cdot$ is the multiplication of integers, is a $(n, 2)$ -ring. It is proved that $\langle P, h, \cdot \rangle$ is isomorphic to $(n, 2)$ -ring of endomorphisms of semicyclic n -group of type $(\infty, 1, l)$.

In the n -group $\langle Z \times Z, h \rangle = \langle Z, f_2 \rangle \times \langle Z, f_2 \rangle$ we define the binary operation $\diamond$ by the rule $(m_1, u_1) \diamond (m_2, u_2) = (m_1 m_2, m_1 u_2 + u_1)$. Then $\langle Z \times Z, h, \diamond \rangle$ is an $(n, 2)$ -nearringsg. It is proved that $\langle Z \times Z, h, \diamond \rangle$ is isomorphic to $(n, 2)$ -nearrings of endomorphisms of a semicyclic n -group of type $(\infty, -1, 0)$.

It is proved that $(n, 2)$ -ring $\langle Z, f, * \rangle$, where $f(z_1, \dots, z_n) = z_1 + \dots + z_n + 1$ and $z_1 * z_2 = z_1 z_2 (n-1) + z_1 + z_2$, is isomorphic to $(n, 2)$ -rings of endomorphisms of infinite cyclic n -group.

On additive group of the ring of residue classes of Z_k we define n -group $\langle Z_k, f_3 \rangle$, where the n -ary operation f_3 operates according to the rule $f_3(z_1, \dots, z_n) = z_1 + m z_2 + \dots + m^{n-2} z_{n-1} + z_n + l$, $1 \leq m < k$ and m is relatively prime to k . In addition, m satisfies the congruence $lm \equiv 1 \pmod{k}$ and multiplicative order of m modulo k divides $n-1$. Any finite semicyclic n -group of order k is isomorphic to n -group $\langle Z_k, f_3 \rangle$, where $l | \gcd(n-1, k)$ for $m = 1$ and $l | \gcd(\frac{m^{n-1}-1}{m-1}, k)$ for $m \neq 1$. We will say that such n -group has type (k, m, l) .

In the n -group $\langle P, h \rangle = \langle Z_k, f_3 \rangle \times \langle Z_l, f_4 \rangle$, $f_4(z_1, \dots, z_n) = z_1 + r z_2 + \dots + r^{n-2} z_{n-1} + z_n$, where r is the remainder of dividing m by l , we define the binary operation $\diamond$ by the rule

$$(u_1, v_1) \diamond (u_2, v_2) = (u_2 s_1 + u_1, v_2 s_1 + v_1)$$

where $s_1 \in Z_k$, $s_1 - 1 = s_0 + v_1 \frac{k}{l}$, and s_0 is solution of congruence $x \equiv \frac{(n-1)u_1}{l} \pmod{\frac{k}{l}}$ for $m = 1$ and $x \equiv \frac{\frac{m^{n-1}-1}{m-1}u_1}{l} \pmod{\frac{k}{l}}$ for $m \neq 1$. It is proved that the algebra $\langle P, h, \diamond \rangle$ is $(n, 2)$ -ring for $m = 1$ and $(n, 2)$ -nearring for $m \neq 1$, which is isomorphic to $(n, 2)$ -ring of endomorphisms of abelian semicyclic n -group of type $(k, 1, l)$ with $m = 1$ and $(n, 2)$ -nearring of endomorphisms of semicyclic n -groups of type (k, m, l) for $m \neq 1$.

It is proved that $(n, 2)$ -ring $\langle Z_k, f, * \rangle$, where $f(z_1, \dots, z_n) = z_1 + \dots + z_n + 1$ and $u_1 * u_2 = u_1 \cdot u_2 \cdot (n-1) + u_1 + u_2$, is isomorphic to $(n, 2)$ -ring of endomorphisms of finite cyclic n -group of order k .

Keywords: n -group, $(n, 2)$ -ring, $(n, 2)$ -nearring, endomorphism.

Bibliography: 15 titles.

For citation:

N. A. Shchuchkin, 2021, "Endomorphisms of semicyclic n -groups", *Chebyshevskii sbornik*, vol. 22, no. 1, pp. 353–369.

1. Введение

В 60-тые и 70-тые годы прошлого века в теории универсальных алгебр активно изучались абелевы алгебры (смотри, например, [1], [2], [3]). Подробную информацию об абелевых алгебрах можно найти в [4], стр. 87. Для многих многообразий классических алгебр описаны все абелевы алгебры. Так, например, в многообразии групп абелевыми алгебрами будут в точности абелевы группы. Непосредственным обобщением понятия группы является определение n -группы для $n \geq 2$.

На непустом множестве G рассмотрим n -арную операцию f , где $n \geq 2$. Алгебру $\langle G, f \rangle$ называют n -группоидом. При действии n -арной операции f для сокращения записи используют стандартные обозначения

$$f(x_1, \dots, x_k, x_{k+1}, \dots, x_{k+s}, x_{k+s+1}, \dots, x_n) = f(x_1^k, x^{(s)}, x_{k+s+1}^n),$$

где $x_{k+1} = \dots = x_{k+s} = x$ (x_i^j - пустой символ при $i > j$, также $x^{(0)}$ - пустой символ).

Если в n -группоиде $\langle G, f \rangle$ выполняется закон ассоциативности

$$\begin{aligned} f(f(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n), x_{n+1}, \dots, x_{2n-1}) &= \\ = f(x_1, f(x_2, \dots, x_{n-1}, x_n, x_{n+1}), \dots, x_{2n-1}) &= \dots \\ \dots = f(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, f(x_n, x_{n+1}, \dots, x_{2n-1})) & \end{aligned} \quad (1)$$

то его называют n -полугруппой. Для удобства в n -полугруппе $\langle G, f \rangle$, используя закон (1), определяют новую $(k(n-1)+1)$ -арную операцию $f_{(k)}$ по правилу

$$f_{(k)}(x_1^{k(n-1)+1}) = \underbrace{f(f(\dots f(f(x_1^n), x_{n+1}^{2n-1}) \dots), x_{(k-1)(n-1)+2}^{k(n-1)+1})}_{k \text{ раз}}.$$

Если в n -полугруппе $\langle G, f \rangle$ для любых элементов $x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$ ($i = 1, \dots, n$) существует и притом единственный элемент z такой, что

$$f(x_1^{i-1}, z, x_{i+1}^n) = x_0, \quad (2)$$

то ее называют n -группой. При $n = 2$ имеем хорошо знакомое нам определение группы. Мы будем изучать n -группы для $n > 2$. Более подробную информацию о теории n -групп можно найти в работах [5], [6], [7].

Одним из обобщений абелевых групп являются полуабелевы n -группы. Если в n -группе верно тождество

$$f(x_1, x_2^{n-1}, x_n) = f(x_n, x_2^{n-1}, x_1), \quad (3)$$

то ее называют полуабелевой. В многообразии n -групп именно полуабелевы n -группы и только они являются абелевыми алгебрами (теорема 3 из [3]).

Если в n -группе верны тождества

$$f(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

для любой подстановки $\sigma \in S_n$, то ее называют абелевой. Ясно, что любая абелева n -группа является полуабелевой, обратно неверно.

Известно, что на множестве E всех эндоморфизмов абелевой алгебры A сигнатуры Ω можно определить операции той же сигнатуры, вместе с которыми E образует абелеву алгебру. Кроме того, композиция эндоморфизмов в E связана с операциями из Ω законами дистрибутивности. Так построенная алгебра E является дистрибутивным кольцоидом над абелевой алгеброй (смотри [4], стр. 89). Например, дистрибутивные кольцоиды над абелевой группой совпадают с ассоциативными кольцами.

Рассмотрим обобщения определений почтикольца и ассоциативного кольца (напомним, алгебру $\langle A, +, \circ \rangle$ называют почтикольцом, если $\langle A, + \rangle$ — группа, не обязательно абелева, $\langle A, \circ \rangle$ — полугруппа и выполнен правый закон дистрибутивности). Алгебру $\langle A, g, \circ \rangle$ с n -арной операцией g и бинарной операцией $\circ$ называют $(n, 2)$ -почтикольцом ($(n, 2)$ -кольцом), если $\langle A, g \rangle$ является n -группой (абелевой n -группой), $\langle A, \circ \rangle$ является полугруппой и выполнен правый закон дистрибутивности

$$g(x_1, \dots, x_n) \circ y = g(x_1 \circ y, \dots, x_n \circ y) \quad (4)$$

(оба закона дистрибутивности: $y \circ g(x_1, \dots, x_n) = g(y \circ x_1, \dots, y \circ x_n)$ и (4)) [3], [8]. Множество E всех эндоморфизмов полуабелевой (абелевой) n -группы $\langle G, f \rangle$ является $(n, 2)$ -почтикольцом ($(n, 2)$ -кольцом) $\langle E, g, \circ \rangle$ с единицей, где n -арная операция g действует по правилу $g(\alpha_1, \dots, \alpha_n)(x) = f(\alpha_1(x), \dots, \alpha_n(x))$ ($x \in G$), и $\circ$ — композиция эндоморфизмов (Следствие 9 (Следствие 10) из [3]).

У изоморфных полуабелевых (абелевых) n -групп $(n, 2)$ -почтикольца ($(n, 2)$ -кольца) эндоморфизмов изоморфны, более того, верна

ТЕОРЕМА 1. *Изоморфизм ψ полуабелевых (абелевых) n -групп $\langle G_1, f_1 \rangle$ и $\langle G_2, f_2 \rangle$ индуцирует изоморфизм τ $(n, 2)$ -почтиколец ($(n, 2)$ -колец) эндоморфизмов $\langle E_1, g_1, \circ \rangle$ и $\langle E_2, g_2, \circ \rangle$, который определяется по формуле $\tau : \alpha \rightarrow \psi^{-1} \circ \alpha \circ \psi$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Проверяется непосредственно.

Обратное утверждение неверно, т.е. можно найти примеры неизоморфных полуабелевых n -групп с изоморфными $(n, 2)$ -почтикольцами эндоморфизмов.

Как и в теории абелевых групп, одной из основных проблем для полуабелевых n -групп, касающихся $(n, 2)$ -почтиколец эндоморфизмов, является нахождение $(n, 2)$ -почтиколец, которые были бы изоморфны $(n, 2)$ -почтикольцам эндоморфизмов некоторых полуабелевых n -групп. Для полуклических n -групп такие $(n, 2)$ -почтикольца найдены ниже.

2. Некоторые сведения из теории полуабелевых n -групп

Теория групп помогает изучать n -группы. Отметим частный случай основных результатов работ [9], [10], [11] для полуабелевых n -групп. На любой полуабелевой n -группе $\langle G, f \rangle$ для фиксированного элемента c определяем сложение

$$a + b = f(a, \overset{(n-3)}{c}, \bar{c}, b),$$

здесь $\bar{c}$ — решение уравнения $f(\binom{n-1}{c}, x) = c$. Получим абелеву группу G с этим сложением, причем элемент c будет нулем в этой группе. Далее, для отображения $\varphi(x) = f(c, x, \binom{n-3}{c}, \bar{c})$, которое является автоморфизмом группы G , и элемента $d = f(\binom{n}{c})$ верны равенства

$$\varphi(d) = d, \quad \varphi^{n-1}(x) = x \quad \text{для любого элемента } x \in G, \quad (5)$$

$$f(a_1, \dots, a_n) = a_1 + \varphi(a_2) + \dots + \varphi^{n-2}(a_{n-1}) + a_n + d \quad (6)$$

для любых элементов $a_1, \dots, a_n \in G$. Группу G в этом случае называют ретрактом n -группы $\langle G, f \rangle$ и обозначают $ret_c \langle G, f \rangle$. Известно, что любые два ретракта одной и той же n -группы изоморфны (смотри [10], [11]).

Верно и обратно: в любой аддитивной абелевой группе G для выбранных автоморфизма φ и элемента d с условиями (5) задается полуабелева n -группа $\langle G, f \rangle$, где f действует по правилу (6). В этом случае n -группу $\langle G, f \rangle$ называют (φ, d) -определенной на группе G и обозначают $der_{\varphi, d} G$.

Применяя теорему 3 из [12] для абелевых групп, получим результат: для абелевой группы G с автоморфизмом φ и элементом d , которые удовлетворяют (5), верно

$$\langle G, + \rangle = ret_0 der_{\varphi, d} \langle G, + \rangle. \quad (7)$$

Применяя теорему 4 из [12] для полуабелевых n -групп, получим результат: для полуабелевой n -группы $\langle G, f \rangle$ верно

$$\langle G, f \rangle = der_{\varphi, d} ret_c \langle G, f \rangle \quad (8)$$

для любого элемента $c \in G$, где автоморфизм φ и элемент d группы $ret_c \langle G, f \rangle$ определены выше.

Известно (смотри, например, [13]), что для абелевых n -групп и только для них автоморфизм φ , построенный выше, является тождественным.

Следующий результат является следствием структурной теоремы о гомоморфизмах n -групп, которая доказана в [14].

ТЕОРЕМА 2. *Отображение ψ является эндоморфизмом полуабелевой n -группы $\langle G, f \rangle$ тогда и только тогда, когда отображение $\sigma = \psi - \psi(c)$ является эндоморфизмом ретракта $ret_c \langle G, f \rangle$ и верны условия*

$$\sigma(d) = \varphi(\psi(c)) + \dots + \varphi^{n-2}(\psi(c)) + \psi(c) + d; \quad \sigma \circ \varphi = \varphi \circ \sigma. \quad (9)$$

СЛЕДСТВИЕ 1. *Отображение ψ является эндоморфизмом абелевой n -группы $\langle G, f \rangle$ тогда и только тогда, когда отображение $\sigma = \psi - \psi(c)$ является эндоморфизмом ретракта $ret_c \langle G, f \rangle$ и верны условия*

$$\sigma(d) = (n-1)\psi(c) + d. \quad (10)$$

3. Полуциклические n -группы

Если ретракт полуабелевой n -группы является циклической группой, то эту n -группу называют полуциклической [6]. Рассмотрим аддитивную группу целых чисел Z , в которой всего два автоморфизма: тождественный 1_Z и φ , где $\varphi(z) = -z$ для любого целого числа z . Строим абелеву n -группу $\langle Z, f_1 \rangle = der_{1_Z, l} Z$, где l — любое целое число, она является примером бесконечной абелевой полуциклической n -группы (согласно равенству (7)). Операция f_1 действует по правилу: $f_1(z_1, \dots, z_n) = z_1 + \dots + z_n + l$. Для не тождественного автоморфизма φ бесконечной циклической группы Z равенство $\varphi^{n-1}(x) = x$ для любого целого числа x верно только

при нечетных n , причем элемент d может быть только нулем. Тогда на бесконечной циклической группе Z можно задать полуциклическую n -группу $\langle Z, f_2 \rangle = \text{der}_{\varphi,0}Z$ для $n = 2k + 1$, $k \in N$, с n -арной операцией $f_2(z_1, \dots, z_n) = z_1 - z_2 + \dots + z_{2k-1} - z_{2k} + z_{2k+1}$.

Любая бесконечная полуциклическая n -группа изоморфна n -группе $\langle Z, f_1 \rangle = \text{der}_{1_Z,l}Z$, где $0 \leq l \leq [\frac{n-1}{2}]$, либо n -группе $\langle Z, f_2 \rangle = \text{der}_{\varphi,0}Z$ для нечетных n (смотри [15]). В первом случае будем говорить, что такая n -группа имеет тип $(\infty, 1, l)$, а во втором случае — имеет тип $(\infty, -1, 0)$.

Если n -группа порождается одним элементом a , то ее называют (как и в группах) циклической с порождающим элементом a . Примером бесконечной циклической n -группы служит n -группа $\langle Z, f_1 \rangle = \text{der}_{1_Z,l}Z$ с порождающим элементом 0. Любая другая бесконечная циклическая n -группа изоморфна этой n -группе (смотри, например, [15]).

Примером конечной полуциклической n -группы порядка k служит n -группа $\langle Z_k, f \rangle = \text{der}_{\varphi,l}Z_k$, (φ, l) -определенная на аддитивной группе кольца классов вычетов по модулю k . Если φ — тождественный автоморфизм, то n -арная операция f действует по правилу $f(z_1^n) = z_1 + \dots + z_n + l$ и $\langle Z_k, f \rangle$ будет абелевой полуциклической n -группой. Среди таких абелевых полуциклических n -групп имеются циклические, в этом случае $\text{НОД}(l, n-1, k) = 1$. Если же φ отличен от тождественного автоморфизма, то $\varphi(z) = mz$ для любого элемента $z \in Z_k$, где $1 < m < k$ и m взаимно прост с k . Кроме того, число m удовлетворяет сравнению $lm \equiv l \pmod{k}$ (согласно первому равенству из (5)) и показатель числа m по модулю k делит $n-1$ (согласно второму равенству из (5)). В этом случае n -арная операция f действует по правилу $f(z_1^n) = z_1 + mz_2 + \dots + m^{n-2}z_{n-1} + z_n + l$.

Любая конечная абелева полуциклическая n -группа порядка k изоморфна абелевой полуциклической n -группе $\text{der}_{1_{Z_k},l}Z_k$, где $l \mid \text{НОД}(n-1, k)$, в этом случае будем говорить, что такая n -группа имеет тип $(k, 1, l)$. Любая конечная циклическая n -группа порядка k изоморфна циклической n -группе $\text{der}_{1_{Z_k},1}Z_k$. Любая конечная не абелева полуциклическая n -группа порядка k изоморфна полуциклической n -группе $\text{der}_{\varphi,l}Z_k$, где $\varphi(z) = mz$ для любого элемента $z \in Z_k$, $1 < m < k$, m взаимно прост с k , число m удовлетворяет сравнению $lm \equiv l \pmod{k}$, показатель числа m по модулю k делит $n-1$ и $l \mid \text{НОД}(\frac{m^{n-1}-1}{m-1}, k)$, в этом случае будем говорить, что такая n -группа имеет тип (k, m, l) (смотри [15]).

4. $(n, 2)$ -Почтикольца эндоморфизмов полуциклических n -групп

В следующей теореме найдено $(n, 2)$ -кольцо, которое изоморфно $(n, 2)$ -кольцу эндоморфизмов бесконечной абелевой полуциклической n -группы $\langle Z, f_1 \rangle = \text{der}_{1_Z,l}Z$, где $0 \leq l \leq [\frac{n-1}{2}]$.

ТЕОРЕМА 3. Пусть $\langle E, g, \circ \rangle$ — $(n, 2)$ -кольцо эндоморфизмов бесконечной абелевой полуциклической n -группы $\langle Z, f_1 \rangle = \text{der}_{1_Z,l}Z$, где $0 \leq l \leq [\frac{n-1}{2}]$. В Z выделим множество $P = \{m \mid ml \equiv l \pmod{n-1}\}$ и на этом множестве определим n -арную операцию h по правилу $h(m_1^n) = m_1 + \dots + m_n$. Тогда алгебра $\langle P, h, \cdot \rangle$, где $\cdot$ — умножение целых чисел, будет $(n, 2)$ -кольцом, которое изоморфно $\langle E, g, \circ \rangle$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим абелеву n -группу $\langle Z, f_1 \rangle = \text{der}_{1_Z,l}Z$. Каждый эндоморфизм σ_m кольца целых чисел Z определяется однозначно образом единицы $\sigma_m(1) = m$, т.е. для любого целого числа z верно $\sigma_m(z) = mz$. В кольце целых чисел Z выделим подмножество $P = \{m \mid ml \equiv l \pmod{n-1}\}$. Для каждого эндоморфизма σ_m , где $m \in P$, находим u — частное от деления числа $l(m-1)$ на число $n-1$ и на аддитивной группе целых чисел Z определим отображение $\psi_m = \sigma_m + u$. Тогда $\psi_m(0) = u$ и отображение $\sigma_m = \psi_m - \psi_m(0)$ — эндоморфизм в Z , кроме того верны условия (9). Согласно теореме 2, отображение ψ_m является эндоморфизмом полуабелевой n -группы $\langle Z, f_1 \rangle = \text{der}_{1_Z,l}Z$. По этой же теореме для каждого эндоморфизма ψ полуабелевой n -группы $\langle Z, f_1 \rangle = \text{der}_{1_Z,l}Z$ отображение $\sigma = \psi - \psi(0)$ является

эндоморфизмом Z и, согласно первому равенству из (9), имеем $\sigma(l) = (n-1)\psi(0) + l$. Если эндоморфизм σ определяется однозначно образом единицы $\sigma(1) = m$, то $\psi_m(0) = u$ — частное от деления числа $l(m-1)$ на число $n-1$. Таким образом, между всеми эндоморфизмами E полуциклической n -группы $\langle Z, f_1 \rangle = \text{der}_{1Z,l}Z$ и множеством P имеется взаимно однозначное соответствие $\tau : \psi_m \rightarrow m$.

На множестве P определим n -арную операцию h по правилу $h(m_1^n) = m_1 + \dots + m_n$. Докажем замкнутость этой операции на множестве P . Для любых целых чисел $m_1^n \in P$ из сравнений $m_i l \equiv l \pmod{n-1}$ ($i = 1, \dots, n$) получим $(m_1 + \dots + m_n)l \equiv nl \pmod{n-1}$ или $(m_1 + \dots + m_n)l \equiv l \pmod{n-1}$, т.е. $h(m_1^n) \in P$.

Очевидно $\langle P, h \rangle$ является n -полугруппой. Выбираем $m_0, m_1, \dots, m_{i-1}, m_{i-1}, \dots, m_n \in P$, где индекс i равен одному из чисел $1, \dots, n$. Находим $z = m_0 - (m_1 + \dots + m_{i-1} + m_{i-1} + \dots + m_n)$, очевидно $z \in P$. Тогда $h(m_1^{i-1}, z, m_{i+1}^n) = m_0$. Единственность нахождения числа z также очевидна. Таким образом, n -полугруппа $\langle P, h \rangle$ является n -группой, кроме того, она будет абелевой.

Докажем замкнутость множества P относительно умножения целых чисел. Пусть целые числа $m_1, m_2 \in P$. Обе части верного сравнения $m_2 l \equiv l \pmod{n-1}$ домножаем на m_1 , получаем $m_1 m_2 l \equiv m_1 l \pmod{n-1}$, но $m_1 l \equiv l \pmod{n-1}$, значит, $m_1 m_2 l \equiv l \pmod{n-1}$, т.е. $m_1 \cdot m_2 \in P$.

Выполнимость обоих законов дистрибутивности для n -арной операции h и умножения целых чисел очевидна. Итак, $\langle P, h, \cdot \rangle$ — $(n, 2)$ -кольцо.

Докажем, что биективное отображение τ является изоморфизмом $(n, 2)$ -колец $\langle E, g, \circ \rangle$ и $\langle P, h, \cdot \rangle$. Так как для любых эндоморфизмов $\psi_{m_1}, \dots, \psi_{m_n} \in E$ и для любого целого числа z получим

$$\begin{aligned} g(\psi_{m_1}, \dots, \psi_{m_n})(z) &= f_1(\psi_{m_1}(z), \dots, \psi_{m_n}(z)) = f_1(\sigma_{m_1}(z) + \psi_{m_1}(0), \dots, \sigma_{m_n}(z) + \psi_{m_n}(0)) = \\ &= f_1(m_1 z + \frac{l(m_1-1)}{n-1}, \dots, m_n z + \frac{l(m_n-1)}{n-1}) = m_1 z + \frac{l(m_1-1)}{n-1} + \dots + m_n z + \frac{l(m_n-1)}{n-1} + l = \\ &= (m_1 + \dots + m_n)z + \frac{l}{n-1}(m_1 + \dots + m_n - n) + l = (m_1 + \dots + m_n)z + \frac{l(m_1 + \dots + m_n - 1)}{n-1}, \end{aligned}$$

то $\tau(g(\psi_{m_1}, \dots, \psi_{m_n})) = h(\tau(\psi_{m_1}), \dots, \tau(\psi_{m_n}))$. Далее, так как для любых эндоморфизмов $\psi_{m_1}, \psi_{m_2} \in E$ и для любого целого числа z получим

$$\begin{aligned} \psi_{m_1} \circ \psi_{m_2}(z) &= \psi_{m_1}(\sigma_{m_2}(z) + \psi_{m_2}(0)) = \psi_{m_1}(m_2 z + \frac{l(m_2-1)}{n-1}) = \\ &= \sigma_{m_1}(m_2 z + \frac{l(m_2-1)}{n-1}) + \psi_{m_1}(0) = m_1(m_2 z + \frac{l(m_2-1)}{n-1}) + \frac{l(m_1-1)}{n-1} = \\ &= m_1 m_2 z + \frac{m_1 m_2 l - l m_1 + l m_1 - l}{n-1} = m_1 m_2 z + \frac{l(m_1 m_2 - 1)}{n-1}, \end{aligned}$$

то $\tau(\psi_{m_1} \circ \psi_{m_2}) = \tau(\psi_{m_1}) \cdot \tau(\psi_{m_2})$. Теорема доказана.

Из теорем 1 и 3 имеем

СЛЕДСТВИЕ 2. Построенное в теореме 3 $(n, 2)$ -кольцо $\langle P, h, \cdot \rangle$ изоморфно $(n, 2)$ -кольцу эндоморфизмов полуциклической n -группы типа $(\infty, 1, l)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 1, из изоморфизма полуциклической n -группы типа $(\infty, 1, l)$ и бесконечной абелевой полуциклической n -группы $\langle Z, f_1 \rangle = \text{der}_{1Z,l}Z$, где $0 \leq l \leq [\frac{n-1}{2}]$, следует изоморфизм $(n, 2)$ -колец эндоморфизмов этих n -групп. Осталось применить теорему 3. Следствие доказано.

СЛЕДСТВИЕ 3. Построенное в теореме 3 $(n, 2)$ -кольцо $\langle P, h, \cdot \rangle$ при $l = 1$ изоморфно $(n, 2)$ -кольцу эндоморфизмов бесконечной циклической n -группы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 1, из изоморфизма бесконечной циклической n -группы и бесконечной абелевой полуциклической n -группы $\langle Z, f_1 \rangle = \text{der}_{1,Z,1}Z$ следует изоморфизм $(n, 2)$ -колец эндоморфизмов этих n -групп. Осталось применить теорему 3 при $l = 1$. Следствие доказано.

В теореме 3 найденное $(n, 2)$ -кольцо $\langle P, h, \cdot \rangle$ определяется на подмножестве целых чисел Z . Можно ли построить такое же $(n, 2)$ -кольцо на всем множестве целых чисел (по аналогии как в группах кольцо эндоморфизмов кольца целых чисел изоморфно кольцу целых чисел)? На этот вопрос положительно отвечает следующая

ТЕОРЕМА 4. На абелевой полуциклической n -группе $\langle Z, f_3 \rangle = \text{der}_{1,Z,v}Z$, где $v = \text{НОД}(n-1, l)$, $0 \leq l \leq [\frac{n-1}{2}]$, определим бинарную операцию $*$ по правилу $z_1 * z_2 = z_1 z_2 t + z_1 + z_2$, где $t = \frac{n-1}{v}$. Тогда алгебра $\langle Z, f_3, * \rangle$ будет $(n, 2)$ -кольцом, которое изоморфно $(n, 2)$ -кольцу $\langle P, h, \cdot \rangle$, построенному в теореме 3.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Проверим ассоциативность операции $*$. Если $z_1, z_2, z_3 \in Z$, то

$$\begin{aligned} (z_1 * z_2) * z_3 &= (z_1 z_2 t + z_1 + z_2) * z_3 = (z_1 z_2 t + z_1 + z_2) z_3 t + z_1 z_2 t + z_1 + z_2 + z_3 = \\ &= z_1 z_2 z_3 t^2 + z_1 z_3 t + z_2 z_3 t + z_1 z_2 t + z_1 + z_2 + z_3 = \\ &= z_1 (z_2 z_3 t + z_3 + z_2) t + z_1 + z_2 z_3 t + z_2 + z_3 = z_1 * (z_2 z_3 t + z_2 + z_3) = z_1 * (z_2 * z_3). \end{aligned}$$

Пусть $z_1, \dots, z_n, z_{n+1} \in Z$. Проверим правую дистрибутивность операций f_3 и $*$.

$$\begin{aligned} f_3(z_1, \dots, z_n) * z_{n+1} &= (z_1 + \dots + z_n + v) z_{n+1} t + z_1 + \dots + z_n + v + z_{n+1} = \\ &= z_1 z_{n+1} t + \dots + z_n z_{n+1} t + v z_{n+1} t + z_1 + \dots + z_n + v + z_{n+1} = \\ &= z_1 z_{n+1} t + \dots + z_n z_{n+1} t + (n-1) z_{n+1} + z_1 + \dots + z_n + v + z_{n+1} = \\ &= z_1 z_{n+1} t + z_1 + z_{n+1} + \dots + z_n z_{n+1} t + z_n + z_{n+1} + v = f_3(z_1 * z_{n+1}, \dots, z_n * z_{n+1}). \end{aligned}$$

Аналогично проверяется левая дистрибутивность операций f_3 и $*$. Итак, $\langle Z, f_3, * \rangle$ — $(n, 2)$ -кольцо.

Докажем изоморфизм этого $(n, 2)$ -кольца и $(n, 2)$ -кольца $\langle P, h, \cdot \rangle$ из теоремы 3. Каждому целому числу z ставим в соответствие τ число $z \frac{n-1}{v} + 1$. Так как $(z \frac{n-1}{v} + 1)l \equiv l \pmod{n-1}$, то $z \frac{n-1}{v} + 1 \in P$, т.е. соответствие τ является отображением из Z в P . Если $\tau(z_1) = \tau(z_2)$ некоторых целых чисел z_1, z_2 , то $z_1 \frac{n-1}{v} + 1 = z_2 \frac{n-1}{v} + 1$, откуда получим $z_1 = z_2$. Инъективность отображения τ доказана. Докажем сюръективность отображения τ . Пусть $m \in P$, тогда $ml \equiv l \pmod{n-1}$, т.е. $(m-1)l = (n-1)q$ для некоторого целого числа q . Полагаем $l = l_1 v$ и $n-1 = n_1 v$ для некоторых целых чисел l_1 и n_1 . Тогда $(m-1)l_1 = n_1 q$ и l_1, n_1 взаимно просты. Значит, $m-1$ делится на n_1 и $\tau(\frac{m-1}{n_1}) = m$. Итак, отображение τ биективно.

Для $z_1, \dots, z_n \in Z$ получим

$$\begin{aligned} \tau(f_3(z_1, \dots, z_n)) &= (z_1 + \dots + z_n + v) \frac{n-1}{v} + 1 = \\ &= (z_1 \frac{n-1}{v} + 1) + \dots + (z_n \frac{n-1}{v} + 1) = h(\tau(z_1), \dots, \tau(z_n)), \end{aligned}$$

кроме того, для $z_1, z_2 \in Z$ будем иметь

$$\begin{aligned} \tau(z_1 * z_2) &= \tau(z_1 z_2 \frac{n-1}{v} + z_1 + z_2) = (z_1 z_2 \frac{n-1}{v} + z_1 + z_2) \frac{n-1}{v} + 1 = \\ &= (z_1 \frac{n-1}{v} + 1)(z_2 \frac{n-1}{v} + 1) = \tau(z_1) \tau(z_2). \end{aligned}$$

Теорема доказана

СЛЕДСТВИЕ 4. Построенное в теореме 4 $(n, 2)$ -кольцо $\langle Z, f_3, * \rangle$ будет изоморфно $(n, 2)$ -кольцу эндоморфизмов полужиклической n -группы типа $(\infty, 1, l)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Достаточно учесть следствие 2 и теорему 4. Следствие доказано.

СЛЕДСТВИЕ 5. Пусть $\langle E, g, \circ \rangle$ — $(n, 2)$ -кольцо эндоморфизмов бесконечной циклической n -группы. Тогда $(n, 2)$ -кольцо $\langle Z, f, * \rangle$, где $f(z_1^n) = z_1 + \dots + z_n + 1$ и $z_1 * z_2 = z_1 z_2 (n-1) + z_1 + z_2$, будет изоморфно $\langle E, g, \circ \rangle$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Достаточно учесть следствие 3 и теорему 4 при $l = 1$. Следствие доказано.

В следующей теореме найдено $(n, 2)$ -почтикольцо, которое изоморфно $(n, 2)$ -почтикольцу эндоморфизмов бесконечной не абелевой полужиклической n -группы $\langle Z, f_2 \rangle = \text{der}_{\varphi, 0} Z$, где n — нечетное натуральное число.

ТЕОРЕМА 5. Пусть $\langle E, g, \circ \rangle$ — $(n, 2)$ -почтикольцо эндоморфизмов бесконечной полужиклической n -группы $\langle Z, f_2 \rangle = \text{der}_{\varphi, 0} Z$, где n — нечетное натуральное число и $\varphi(z) = -z$ для любого целого числа z . Выбираем n -группу $\langle Z \times Z, h \rangle = \langle Z, f_2 \rangle \times \langle Z, f_2 \rangle$ и на множестве $Z \times Z$ определим бинарную операцию $\diamond$ по правилу

$$(m_1, u_1) \diamond (m_2, u_2) = (m_1 m_2, m_1 u_2 + u_1).$$

Тогда $\langle Z \times Z, h, \diamond \rangle$ будет $(n, 2)$ -почтикольцом, которое изоморфно $\langle E, g, \circ \rangle$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим полуабелеву n -группу $\langle Z, f_2 \rangle = \text{der}_{\varphi, 0} Z$, где n — нечетное натуральное число и $\varphi(z) = -z$ для любого целого числа z . Для каждого эндоморфизма σ_m кольца целых чисел Z , который определяется однозначно образом единицы $\sigma_m(1) = m$, и для каждого целого числа u определим отображение $\psi_{(m, u)}$ на множестве целых чисел Z по правилу $\psi_{(m, u)}(z) = \sigma_m(z) + u = mz + u$. Тогда $\psi_{(m, u)}(0) = u$ и для σ_m и $\psi_{(m, u)}(0)$ верны условия (9). Согласно теореме 2, отображение $\psi_{(m, u)}$ является эндоморфизмом полуабелевой n -группы $\langle Z, f_2 \rangle = \text{der}_{\varphi, 0} Z$. Далее, для любого эндоморфизма ψ полуабелевой n -группы $\langle Z, f_2 \rangle = \text{der}_{\varphi, 0} Z$, согласно теореме 2, определяем эндоморфизм σ аддитивной группы Z по правилу $\sigma = \psi + \psi(0)$. Но эндоморфизм σ определяется однозначно образом единицы $\sigma(1) = m$. Таким образом, между всеми эндоморфизмами E полужиклической n -группы $\langle Z, f_2 \rangle = \text{der}_{\varphi, 0} Z$ и декартовым квадратом Z^2 имеется взаимно однозначное соответствие $\tau : \psi_{(m, u)} \rightarrow (m, u)$.

Выбираем n -группу $\langle Z \times Z, h \rangle = \langle Z, f_2 \rangle \times \langle Z, f_2 \rangle$ и на множестве $Z \times Z$ определим бинарную операцию $\diamond$ по правилу, указанному в теореме. Так как для любых трех пар целых чисел $(m_1, u_1), (m_2, u_2), (m_3, u_3)$ имеем

$$\begin{aligned} ((m_1, u_1) \diamond (m_2, u_2)) \diamond (m_3, u_3) &= (m_1 m_2, m_1 u_2 + u_1) \diamond (m_3, u_3) = \\ &= ((m_1 m_2) m_3, m_1 m_2 u_3 + m_1 u_2 + u_1) = (m_1 (m_2 m_3), m_1 (m_2 u_3 + u_2) + u_1) = \\ &= (m_1, u_1) \diamond (m_2 m_3, m_2 u_3 + u_2) = (m_1, u_1) \diamond ((m_2, u_2) \diamond (m_3, u_3)), \end{aligned}$$

то $\langle Z \times Z, \diamond \rangle$ является полугруппой.

Далее, для любых пар целых чисел $(m_1, u_1), \dots, (m_n, u_n), (m_{n+1}, u_{n+1})$ имеем

$$\begin{aligned} h((m_1, u_1), \dots, (m_n, u_n)) \diamond (m_{n+1}, u_{n+1}) &= (f_2(m_1^n), f_2(u_1^n)) \diamond (m_{n+1}, u_{n+1}) = \\ &= ((m_1 - m_2 + \dots + m_{n-2} - m_{n-1} + m_n) m_{n+1}, (m_1 - m_2 + \dots + m_{n-2} - m_{n-1} + m_n) u_{n+1} + \\ &\quad + (u_1 - u_2 + \dots + u_{n-2} - u_{n-1} + u_n)) = \\ &= (m_1 m_{n+1} - m_2 m_{n+1} + \dots + m_{n-2} m_{n+1} - m_{n-1} m_{n+1} + m_n m_{n+1}, \end{aligned}$$

$$m_1 u_{n+1} + u_1 - m_2 u_{n+1} - u_2 + \dots + m_{n-2} u_{n+1} + u_{n-2} - m_{n-1} u_{n+1} - u_{n-1} + m_n u_{n+1} + u_n = \\ = h((m_1, u_1) \diamond (m_{n+1}, u_{n+1}), \dots, (m_n, u_n) \diamond (m_{n+1}, u_{n+1})).$$

Итак, $\langle Z \times Z, h, \diamond \rangle - (n, 2)$ -почтикольцо.

Докажем, что биективное отображение τ является изоморфизмом $(n, 2)$ -почтиколец $\langle E, g, \circ \rangle$ и $\langle Z \times Z, h, \diamond \rangle$. Так как для любого целого числа z и для любых эндоморфизмов $\psi_{(m_1, u_1)}, \dots, \psi_{(m_n, u_n)} \in E$ получим

$$g(\psi_{(m_1, u_1)}, \dots, \psi_{(m_n, u_n)})(z) = f_2(\psi_{(m_1, u_1)}(z), \dots, \psi_{(m_n, u_n)}(z)) = \\ = f_2(\sigma_{m_1}(z) + u_1, \dots, \sigma_{m_n}(z) + u_n) = f_2(m_1 z + u_1, \dots, m_n z + u_n) = \\ = m_1 z + u_1 - m_2 z - u_2 + \dots + m_{n-2} z + u_{n-2} - m_{n-1} z - u_{n-1} + m_n z + u_n = \\ = (m_1 - m_2 + \dots + m_{n-2} - m_{n-1} + m_n)z + u_1 - u_2 + \dots + u_{n-2} - u_{n-1} + u_n = \\ = f_2(m_1^n z + u_1^n),$$

то $\tau(g(\psi_{(m_1, u_1)}, \dots, \psi_{(m_n, u_n)})) = h(\tau(\psi_{(m_1, u_1)}), \dots, \tau(\psi_{(m_n, u_n)}))$. Далее, так как для любых эндоморфизмов $\psi_{(m_1, u_1)}, \psi_{(m_2, u_2)} \in E$ и для любого целого числа z получим

$$\psi_{(m_1, u_1)} \circ \psi_{(m_2, u_2)}(z) = \psi_{(m_1, u_1)}(\sigma_{m_2}(z) + \psi_{(m_2, u_2)}(0)) = \psi_{(m_1, u_1)}(m_2 z + u_2) = \\ = \sigma_{m_1}(m_2 z + u_2) + \psi_{(m_1, u_1)}(0) = m_1(m_2 z + u_2) + u_1 = m_1 m_2 z + m_1 u_2 + u_1,$$

то $\tau(\psi_{(m_1, u_1)} \circ \psi_{(m_2, u_2)}) = \tau(\psi_{(m_1, u_1)}) \diamond \tau(\psi_{(m_2, u_2)})$. Теорема доказана.

Из теорем 1 и 5 имеем

СЛЕДСТВИЕ 6. Построенное в теореме 5 $(n, 2)$ -почтикольцо $\langle Z \times Z, h, \diamond \rangle$ будет изоморфно $(n, 2)$ -почтикольцу эндоморфизмов полуциклической n -группы типа $(\infty, -1, 0)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 1, из изоморфизма полуциклической n -группы типа $(\infty, -1, 0)$ и бесконечной полуциклической n -группы $\langle Z, f_2 \rangle = \text{der}_{\varphi, 0} Z$, где n — нечетное натуральное число и $\varphi(z) = -z$ для любого целого числа z , следует изоморфизм $(n, 2)$ -почтиколец эндоморфизмов этих n -групп. Осталось применить теорему 5. Следствие доказано.

Теперь приступим к изучению $(n, 2)$ -почтиколец эндоморфизмов конечных полуциклических n -групп. Сначала изучим $(n, 2)$ -кольцо эндоморфизмов конечной не абелевой полуциклической n -группы.

ТЕОРЕМА 6. Пусть $\langle E, g, \circ \rangle - (n, 2)$ -почтикольцо эндоморфизмов полуциклической n -группы $\text{der}_{\varphi, l} Z_k$, где $\varphi(z) = mz$ для любого элемента $z \in Z_k$, $1 < m < k$, m взаимно просто с k , число m удовлетворяет сравнению $lm \equiv 1 \pmod{k}$, показатель числа m по модулю k делит $n - 1$ и $l \mid \text{НОД}(\frac{m^{n-1}-1}{m-1}, k)$. В полуабелевой n -группе $\langle P, h \rangle = \text{der}_{\varphi, l} Z_k \times \text{der}_{\varphi, 0} Z_l$ определим бинарную операцию $\diamond$ по правилу

$$(u_1, v_1) \diamond (u_2, v_2) = (u_2 s_1 + u_1, v_2 s_1 + v_1)$$

где $s_1 \in Z_k$ и $s_1 - 1 = s_0 + v_1 \frac{k}{l}$, где s_0 — решение сравнения $x \equiv \frac{m^{n-1}-1}{m-1} u_1 \pmod{\frac{k}{l}}$. Тогда алгебра $\langle P, h, \diamond \rangle$ будет $(n, 2)$ -почтикольцом, которое изоморфно $\langle E, g, \circ \rangle$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для каждого эндоморфизма $\psi \in E$ полагаем $\psi(0) = u$. Согласно теореме 2, отображение $\sigma = \psi - u$ является эндоморфизмом аддитивной группы кольца классов вычетов Z_k , который определяется однозначно образом единицы $\sigma(1) = s$, т.е. для любого целого числа $z \in Z_k$ верно $\sigma(z) \equiv sz \pmod{k}$. Кроме того, согласно первому равенству из (9), верно сравнение

$$sl \equiv (1 + m + \dots + m^{n-2})u + l \pmod{k},$$

или, что то же самое, $\frac{m^{n-1}-1}{m-1}u \equiv l(s-1) \pmod{k}$, а значит, целое число $s-1$ является решением сравнения $lx \equiv \frac{m^{n-1}-1}{m-1}u \pmod{k}$. Так как $l \mid \text{НОД}(\frac{m^{n-1}-1}{m-1}, k)$, то $\text{НОД}(l, k) = l$, а значит, $s-1 = s_0 + v\frac{k}{l}$, где s_0 — решение сравнения $x \equiv \frac{m^{n-1}-1}{l}u \pmod{\frac{k}{l}}$, $0 \leq v < l$. Заметим, что второе равенство из (9) верно в силу коммутативности умножения в кольце Z_k .

Таким образом, мы имеем отображение $\tau : E \rightarrow P$, заданное по правилу $\tau(\psi) = (u, v)$, где $u = \psi(0)$, а v участвует в процессе вычисления образа единицы s при эндоморфизме ψ — u аддитивной группы кольца классов вычетов Z_k , т.е. $s-1 = s_0 + v\frac{k}{l}$, где s_0 — решение сравнения $x \equiv \frac{m^{n-1}-1}{l}u \pmod{\frac{k}{l}}$.

Докажем инъективность отображения τ . Пусть $\tau(\psi_1) = \tau(\psi_2)$ для некоторых эндоморфизмов $\psi_1, \psi_2 \in E$ и $\tau(\psi_1) = (u_1, v_1)$, $\tau(\psi_2) = (u_2, v_2)$. Тогда $u_1 = u_2$ и $v_1 = v_2$. Для каждого индекса $i = 1, 2$ находим образ единицы s_i при эндоморфизме ψ_i — u_i аддитивной группы кольца классов вычетов Z_k : $s_i - 1 = s_{0i} + v_i\frac{k}{l}$, где s_{0i} — решение сравнения $x \equiv \frac{m^{n-1}-1}{l}u_i \pmod{\frac{k}{l}}$. Так как $u_1 = u_2$, то $s_{01} = s_{02}$, а так как $v_1 = v_2$, то $s_1 = s_2$. Каждый эндоморфизм ψ_i ($i = 1, 2$) действует по правилу $\psi_i(z) = s_i z + u_i$ для любого целого числа $z \in Z_k$, значит, $\psi_1 = \psi_2$. Итак, τ — инъективное отображение.

Докажем суръективность отображения τ . Пусть $(u, v) \in Z_k \times Z_l$. Находим s_0 — решение сравнения $x \equiv \frac{m^{n-1}-1}{l}u \pmod{\frac{k}{l}}$ и $0 \leq s_0 < \frac{k}{l}$. Далее, находим $s-1 = s_0 + v\frac{k}{l}$ — решение сравнения $lx \equiv \frac{m^{n-1}-1}{m-1}u \pmod{k}$. Эндоморфизм σ аддитивной группы кольца классов вычетов Z_k , действующий по правилу $\sigma(z) = sz$ для любого целого числа $z \in Z_k$, удовлетворяет обоим условиям из (9), а значит, согласно теореме 2, отображение $\psi = \sigma - u$ является эндоморфизмом полуабелевой n -группы $\text{der}_{\varphi, l} Z_k$ и $\tau(\psi) = (u, v)$. Доказана суръективность отображения τ .

Бинарная операция $\diamond$, определенная на множестве $Z_k \times Z_l$ в теореме, является ассоциативной, так как для любых пар (u_1, v_1) , (u_2, v_2) , (u_3, v_3) из $Z_k \times Z_l$ получим

$$\begin{aligned} ((u_1, v_1) \diamond (u_2, v_2)) \diamond (u_3, v_3) &= (u_2 s_1 + u_1, v_2 s_1 + v_1) \diamond (u_3, v_3) = \\ &= (u_3 s' + u_2 s_1 + u_1, v_3 s' + v_2 s_1 + v_1), \end{aligned}$$

где $s_1 - 1 = s_{01} + v_1\frac{k}{l}$, s_{01} — решение сравнения $x \equiv \frac{m^{n-1}-1}{l}u_1 \pmod{\frac{k}{l}}$ и $s' - 1 = s'_0 + (v_2 s_1 + v_1)\frac{k}{l}$, s'_0 — решение сравнения $x \equiv \frac{m^{n-1}-1}{l}(u_2 s_1 + u_1) \pmod{\frac{k}{l}}$. С другой стороны,

$$\begin{aligned} (u_1, v_1) \diamond ((u_2, v_2) \diamond (u_3, v_3)) &= (u_1, v_1) \diamond (u_3 s_2 + u_2, v_3 s_2 + v_2) = \\ &= ((u_3 s_2 + u_2) s_1 + u_1, (v_3 s_2 + v_2) s_1 + v_1) = (u_3 s_1 s_2 + u_2 s_1 + u_1, v_3 s_1 s_2 + v_2 s_1 + v_1), \end{aligned}$$

где $s_2 - 1 = s_{02} + v_2\frac{k}{l}$, s_{02} — решение сравнения $x \equiv \frac{m^{n-1}-1}{l}u_2 \pmod{\frac{k}{l}}$. Так как $s_2 - 1 \equiv \frac{m^{n-1}-1}{l}u_2 + v_2\frac{k}{l} \pmod{k}$, то, домножая обе части этого сравнения на s_1 и складывая с верным сравнением $s_1 - 1 \equiv \frac{m^{n-1}-1}{l}u_1 + v_1\frac{k}{l} \pmod{k}$, получим

$$s_1 s_2 - 1 \equiv \frac{m^{n-1}-1}{l}(s_1 u_2 + u_1) + (s_1 v_2 + v_1)\frac{k}{l} \pmod{k}. \quad (11)$$

Но $s' - 1 \equiv \frac{m^{n-1}-1}{l}(s_1 u_2 + u_1) + (s_1 v_2 + v_2)\frac{k}{l} \pmod{k}$, значит, $s' \equiv s_1 s_2 \pmod{k}$. Из верности последнего сравнения следует $u_3 s' + u_2 s_1 + u_1 \equiv u_3 s_1 s_2 + u_2 s_1 + u_1 \pmod{k}$ и $s' \equiv s_1 s_2 \pmod{l}$ (так как $l \mid k$), из верности последнего сравнения следует $v_3 s' + v_2 s_1 + v_1 \equiv v_3 s_1 s_2 + v_2 s_1 + v_1 \pmod{l}$. Мы доказали равенство

$$((u_1, v_1) \diamond (u_2, v_2)) \diamond (u_3, v_3) = (u_1, v_1) \diamond ((u_2, v_2) \diamond (u_3, v_3)).$$

Итак, $\langle P, \diamond \rangle$ является полугруппой. Докажем, что для n -арной операции h и бинарной операции $\diamond$ выполнен правый закон дистрибутивности (4). Пусть $(u_i, v_i) \in Z_k \times Z_l$, $i = 1, \dots, n, n+1$. Тогда

$$\begin{aligned} & h((u_1, v_1), \dots, (u_n, v_n)) \diamond (u_{n+1}, v_{n+1}) = \\ & = (u_1 + mu_2 + \dots + m^{n-2}u_{n-1} + u_n + l, v_1 + mv_2 + \dots + m^{n-2}v_{n-1} + v_n) \diamond (u_{n+1}, v_{n+1}) = \\ & = (u_{n+1}s' + u_1 + mu_2 + \dots + m^{n-2}u_{n-1} + u_n + l, v_{n+1}s' + v_1 + mv_2 + \dots + m^{n-2}v_{n-1} + v_n), \end{aligned}$$

где $s' - 1 = s'_0 + (v_1 + mv_2 + \dots + m^{n-2}v_{n-1} + v_n)\frac{k}{l}$, s'_0 — решение сравнения

$$x \equiv \frac{\frac{m^{n-1}-1}{m-1}(u_1 + mu_2 + \dots + m^{n-2}u_{n-1} + u_n + l)}{l} \pmod{\frac{k}{l}}.$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} & h((u_1, v_1) \diamond (u_{n+1}, v_{n+1}), \dots, (u_n, v_n) \diamond (u_{n+1}, v_{n+1})) = \\ & = h((u_{n+1}s_1 + u_1, v_{n+1}s_1 + v_1), \dots, (u_{n+1}s_n + u_n, v_{n+1}s_n + v_n)) = \\ & = (u_{n+1}s_1 + u_1 + m(u_{n+1}s_2 + u_2) + \dots + m^{n-2}(u_{n+1}s_{n-1} + u_{n-1}) + u_{n+1}s_n + u_n + l, \\ & \quad v_{n+1}s_1 + v_1 + m(v_{n+1}s_2 + v_2) + \dots + m^{n-2}(v_{n+1}s_{n-1} + v_{n-1}) + v_{n+1}s_n + v_n), \end{aligned}$$

где $s_i - 1 = s_{0i} + v_i\frac{k}{l}$, s_{0i} — решение сравнения $x \equiv \frac{\frac{m^{n-1}-1}{m-1}u_i}{l} \pmod{\frac{k}{l}}$, $i = 1, \dots, n$. Верные n сравнений $s_i - 1 \equiv \frac{\frac{m^{n-1}-1}{m-1}u_i}{l} + v_i\frac{k}{l} \pmod{k}$ складываем, предварительно умножив каждое i -тое сравнение на m^{i-1} ($i = 1, \dots, n$), получим

$$\begin{aligned} & s_1 + ms_2 + \dots + m^{n-2}s_{n-1} + s_n - 1 - (1 + m + \dots + m^{n-2}) \equiv \\ & \equiv \frac{\frac{m^{n-1}-1}{m-1}}{l} (u_1 + mu_2 + \dots + m^{n-2}u_{n-1} + u_n) + (v_1 + mv_2 + \dots + m^{n-2}v_{n-1} + v_n)\frac{k}{l} \pmod{k}, \end{aligned}$$

но $1 + m + \dots + m^{n-2} = \frac{m^{n-1}-1}{m-1}$, тогда

$$\begin{aligned} & s_1 + ms_2 + \dots + m^{n-2}s_{n-1} + s_n - 1 \equiv \frac{\frac{m^{n-1}-1}{m-1}}{l} (u_1 + mu_2 + \dots + m^{n-2}u_{n-1} + u_n + l) + \\ & + (v_1 + mv_2 + \dots + m^{n-2}v_{n-1} + v_n)\frac{k}{l} \pmod{k}. \end{aligned} \quad (12)$$

Заметим, что правая часть последнего сравнения также сравнима с целым числом $s' - 1$, значит, $s_1 + ms_2 + \dots + m^{n-2}s_{n-1} + s_n - 1 \equiv s' \pmod{k}$. Обе части последнего сравнения домножаем на целое число u_{n+1} , а затем прибавляем к обеим частям сравнения сумму $u_1 + mu_2 + \dots + m^{n-2}u_{n-1} + u_n + l$, получим

$$\begin{aligned} & u_{n+1}s_1 + u_1 + m(u_{n+1}s_2 + u_2) + \dots + m^{n-2}(u_{n+1}s_{n-1} + u_{n-1}) + u_{n+1}s_n + u_n + l \equiv \\ & \equiv u_{n+1}s' + u_1 + mu_2 + \dots + m^{n-2}u_{n-1} + u_n + l \pmod{k}. \end{aligned}$$

Аналогично обе части последнего сравнения домножаем на целое число v_{n+1} , а затем прибавляем к обеим частям сравнения сумму $v_1 + mv_2 + \dots + m^{n-2}v_{n-1} + v_n$, получим

$$\begin{aligned} & v_{n+1}s_1 + v_1 + m(v_{n+1}s_2 + v_2) + \dots + m^{n-2}(v_{n+1}s_{n-1} + v_{n-1}) + v_{n+1}s_n + v_n \equiv \\ & \equiv v_{n+1}s' + v_1 + mv_2 + \dots + m^{n-2}v_{n-1} + v_n \pmod{k}. \end{aligned}$$

Из последних двух сравнений имеем верное равенство

$$h((u_1, v_1), \dots, (u_n, v_n)) \diamond (u_{n+1}, v_{n+1}) =$$

$$= h((u_1, v_1) \diamond (u_{n+1}, v_{n+1}), \dots, (u_n, v_n) \diamond (u_{n+1}, v_{n+1})).$$

Итак, алгебра $\langle P, h, \diamond \rangle$ является $(n, 2)$ -почтикольцом. Докажем, что биективное отображение τ сохраняет n -арную и бинарную операции. Пусть $\psi_i \in E$, $i = 1, \dots, n$, тогда для любого целого числа $z \in Z_k$ имеем $\psi_i(z) = s_i z + u_i$, где s_i — образ единицы при эндоморфизме ψ_i — u_i аддитивной группы кольца классов вычетов Z_k и $s_i - 1 = s_{0i} + v_i \frac{k}{l}$, s_{0i} — решение сравнения $x \equiv \frac{m^{n-1}-1}{l} u_i \pmod{\frac{k}{l}}$, $0 \leq v_i < l$. Тогда эндоморфизм $g(\psi_1^n)$ из E действует по правилу (для любого целого числа $z \in Z_k$)

$$\begin{aligned} g(\psi_1^n)(z) &= \psi_1(z) + m\psi_2(z) + \dots + m^{n-2}\psi_{n-1}(z) + \psi_n(z) + l = \\ &= s_1 z + u_1 + m(s_2 z + u_2) + \dots + m^{n-2}(s_{n-1} z + u_{n-1}) + s_n z + u_n + l = \\ &= (s_1 + ms_2 + \dots + m^{n-2}s_{n-1} + s_n)z + u_1 + mu_2 + \dots + m^{n-2}u_{n-1} + u_n + l. \end{aligned}$$

Так как верно сравнение (12), то

$$\tau(g(\psi_1^n)) = (u_1 + mu_2 + \dots + m^{n-2}u_{n-1} + u_n + l, v_1 + mv_2 + \dots + m^{n-2}v_{n-1} + v_n).$$

С другой стороны, согласно правилу действия n -арной операции h , получим

$$\begin{aligned} h(\tau(\psi_1), \dots, \tau(\psi_n)) &= h((u_1, v_1), \dots, (u_n, v_n)) = \\ &= (u_1 + mu_2 + \dots + m^{n-2}u_{n-1} + u_n + l, v_1 + mv_2 + \dots + m^{n-2}v_{n-1} + v_n). \end{aligned}$$

Значит, $\tau(g(\psi_1^n)) = h(\tau(\psi_1), \dots, \tau(\psi_n))$. Пусть теперь $\psi_1, \psi_2 \in E$. Эндоморфизм $\psi_1 \circ \psi_2$ из E действует по правилу (для любого целого числа $z \in Z_k$)

$$\psi_1 \circ \psi_2(z) = \psi_1(s_2 z + v_2) = s_1(s_2 z + v_2) + u_1 = s_1 s_2 z + s_1 v_2 + u_1.$$

Так как верно сравнение (11), то $\tau(\psi_1 \circ \psi_2) = (s_1 u_2 + u_1, s_1 v_2 + v_1)$. С другой стороны, согласно правилу действия бинарной операции $\diamond$, получим

$$\tau(\psi_1) \diamond \tau(\psi_2) = (u_1, v_1) \diamond (u_2, v_2) = (s_1 u_2 + u_1, s_1 v_2 + v_1).$$

Значит, $\tau(\psi_1 \circ \psi_2) = \tau(\psi_1) \diamond \tau(\psi_2)$. Теорема доказана.

Заметим, что в теореме 6 при построении n -группы $der_{\varphi,0} Z_l$ автоморфизм φ задается целым числом m , на которое накладываются условия, указанные в теореме 6. Но при определении n -группы $der_{\varphi,0} Z_l$ автоморфизм φ аддитивной группы кольца целых чисел Z_l должен задаваться целым числом m' таким, что $1 \leq m' < l$, m' взаимно прост с l , показатель числа m' по модулю l делит $n - 1$. Поэтому m' выбирается как остаток от деления числа m на l . Понятно, что в этом случае $mz \equiv m'z \pmod{l}$ для любого целого числа $z \in Z_l$. Кроме того, m' взаимно прост с l , так как m взаимно прост с l в силу того, что $l \mid k$ и m взаимно прост с k . Далее, показатель числа m по модулю k делится на показатель этого числа по модулю l (так как $l \mid k$), значит, показатель числа m по модулю l делит $n - 1$, так как показатель этого числа по модулю k делит $n - 1$. Но показатели чисел m и m' по модулю l совпадают (так как $m \equiv m' \pmod{l}$), тогда показатель числа m' по модулю l делит $n - 1$. Таким образом, задания автоморфизма φ целыми числами m и m' при построении n -группы $der_{\varphi,0} Z_l$ совпадают.

Из теорем 1 и 6 имеем

СЛЕДСТВИЕ 7. Построенное в теореме 6 $(n, 2)$ -почтикольцо $\langle P, h, \diamond \rangle$ будет изоморфно $(n, 2)$ -почтикольцу эндоморфизмов не абелевой полугрупповой n -группы типа (k, m, l) .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 1, из изоморфизма не абелевой полуциклической n -группы типа (k, m, l) и полуциклической n -группы $der_{\varphi, l} Z_k$, где $\varphi(z) = mz$ для любого элемента $z \in Z_k$, $1 < m < k$, m взаимно просто с k , число m удовлетворяет сравнению $lm \equiv l \pmod{k}$, показатель числа m по модулю k делит $n - 1$ и $l \mid \text{НОД}(\frac{m^{n-1}-1}{m-1}, k)$, следует изоморфизм $(n, 2)$ -почтиколец эндоморфизмов этих n -групп. Осталось применить теорему 6. Следствие доказано.

Теперь изучим $(n, 2)$ -кольцо эндоморфизмов конечной абелевой полуциклической n -группы.

ТЕОРЕМА 7. Пусть $\langle E, g, \circ \rangle$ — $(n, 2)$ -кольцо эндоморфизмов абелевой полуциклической n -группы $der_{1_{Z_k}, l} Z_k$, где $l \mid \text{НОД}(n - 1, k)$. В абелевой n -группе $\langle P, h \rangle = der_{1_{Z_k}, l} Z_k \times der_{1_{Z_l}, 0} Z_l$ определим бинарную операцию $\diamond$ по правилу

$$(u_1, v_1) \diamond (u_2, v_2) = (u_2 s_1 + u_1, v_2 s_1 + v_1),$$

где $s_1 \in Z_k$ и $s_1 - 1 = s_0 + v_1 \frac{k}{l}$, где s_0 — решение сравнения $x \equiv \frac{(n-1)u_1}{l} \pmod{\frac{k}{l}}$. Тогда алгебра $\langle P, h, \diamond \rangle$ будет $(n, 2)$ -кольцом, которое изоморфно $\langle E, g, \circ \rangle$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так же, как в доказательстве теоремы 6, для каждого эндоморфизма $\psi \in E$ полагаем $\psi(0) = u$. Согласно следствию 1, отображение $\sigma = \psi - u$ является эндоморфизмом аддитивной группы кольца классов вычетов Z_k , который определяется однозначно образом единицы $\sigma(1) = s$, т.е. для любого целого числа $z \in Z_k$ верно $\sigma(z) \equiv sz \pmod{k}$. Кроме того, согласно равенству (10), верно сравнение $sl \equiv (n-1)u + l \pmod{k}$, или, что то же самое, $(n-1)u \equiv l(s-1) \pmod{k}$, а значит, целое число $s-1$ является решением сравнения $lx \equiv (n-1)u \pmod{k}$. Так как $l \mid \text{НОД}(n-1, k)$, то $\text{НОД}(l, k) = l$, а значит, $s-1 = s_0 + v \frac{k}{l}$, где s_0 — решение сравнения $x \equiv \frac{(n-1)u}{l} \pmod{\frac{k}{l}}$, $0 \leq v < l$.

Таким образом, как и в доказательстве теоремы 6, мы имеем отображение $\tau : E \rightarrow P$, заданное по правилу $\tau(\psi) = (u, v)$, где $u = \psi(0)$, а v участвует в процессе вычисления образа единицы s при эндоморфизме $\psi - u$ аддитивной группы кольца классов вычетов Z_k , т.е. $s-1 = s_0 + v \frac{k}{l}$, где s_0 — решение сравнения $x \equiv \frac{(n-1)u}{l} \pmod{\frac{k}{l}}$. Инъективность и сюръективность отображения τ доказывается так же, как при доказательстве этих свойств отображения τ в теореме 6, заменив дробь $\frac{m^{n-1}-1}{m-1}$ на $n-1$.

Бинарная операция $\diamond$, определенная на множестве $Z_k \times Z_l$ в теореме, является ассоциативной, доказывается так же, как в теореме 6, заменив дробь $\frac{m^{n-1}-1}{m-1}$ на $n-1$. Итак, $\langle P, \diamond \rangle$ является полугруппой. Правый закон дистрибутивности (4) для n -арной операции h и бинарной операции $\diamond$ вновь доказывается как в теореме 6, заменив дробь $\frac{m^{n-1}-1}{m-1}$ на $n-1$. Докажем левый закон дистрибутивности для этих операций. Пусть $(u_i, v_i), (u, v) \in Z_k \times Z_l$, $i = 1, \dots, n$. Тогда

$$\begin{aligned} (u, v) \diamond h((u_1, v_1), \dots, (u_n, v_n)) &= (u, v) \diamond (u_1 + \dots + u_n + l, v_1 + \dots + v_n) = \\ &= ((u_1 + \dots + u_n + l)s + u, (v_1 + \dots + v_n)s + v), \end{aligned}$$

где $s-1 = s_0 + v \frac{k}{l}$, s_0 — решение сравнения $x \equiv \frac{(n-1)u}{l} \pmod{\frac{k}{l}}$. С другой стороны,

$$\begin{aligned} h((u, v) \diamond (u_1, v_1), \dots, (u, v) \diamond (u_n, v_n)) &= h((u_1 s + u, v_1 s + v), \dots, (u_n s + u, v_n s + v)) = \\ &= (u_1 s + u + \dots + u_n s + u + l, v_1 s + v + \dots + v_n s + v) = ((u_1 + \dots + u_n)s + nu + l, (v_1 + \dots + v_n)s + nv), \end{aligned}$$

но $(n-1)u + l \equiv sl \pmod{k}$ и $(n-1)v \equiv 0 \pmod{l}$ (так как $l \mid (n-1)$), значит, последнее выражение равно

$$((u_1 + \dots + u_n + l)s + u, (v_1 + \dots + v_n)s + v).$$

Тогда

$$(u, v) \diamond h((u_1, v_1), \dots, (u_n, v_n)) = h((u, v) \diamond (u_1, v_1), \dots, (u, v) \diamond (u_n, v_n)).$$

Итак, алгебра $\langle P, h, \diamond \rangle$ является $(n, 2)$ -кольцом. Сохранение n -арной и бинарной операции при биективном отображении τ доказывается так же, как в доказательстве теоремы 6, заменив дробь $\frac{m^{n-1}-1}{m-1}$ на $n-1$. Теорема доказана.

Из теорем 1 и 7 имеем

СЛЕДСТВИЕ 8. Построенное в теореме 7 $(n, 2)$ -кольцо $\langle P, h, \diamond \rangle$ будет изоморфно $(n, 2)$ -кольцу эндоморфизмов абелевой полугрупповых n -группы типа $(k, 1, l)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 1, из изоморфизма абелевой полугрупповых n -группы типа $(k, 1, l)$ и полугрупповых n -группы $der_{1_{Z_k}, l} Z_k$, где $l \mid \text{НОД}(n-1, k)$, следует изоморфизм $(n, 2)$ -колец эндоморфизмов этих n -групп. Осталось применить теорему 7. Следствие доказано.

Изучим $(n, 2)$ -кольцо эндоморфизмов конечной циклической n -группы.

СЛЕДСТВИЕ 9. Пусть $\langle E, g, \circ \rangle$ — $(n, 2)$ -кольцо эндоморфизмов конечной циклической n -группы порядка k . В циклической n -группе $\langle Z_k, f \rangle = der_{1_{Z_k}, 1} Z_k$ определим бинарную операцию $\diamond$ по правилу

$$u_1 \diamond u_2 = u_1 \cdot u_2 \cdot (n-1) + u_1 + u_2,$$

где $\cdot$ — умножение по модулю k . Тогда алгебра $\langle Z_k, f, \diamond \rangle$ будет $(n, 2)$ -кольцом, которое изоморфно $\langle E, g, \circ \rangle$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Заметим, что при $l = 1$ в теореме 7 n -группа $der_{1_{Z_l}, 1} Z_l$ будет одноэлементной, а операция $\diamond$ преобразуется в указанную операцию. Осталось применить теорему 7. Следствие доказано.

5. Заключение

В работе строились $(n, 2)$ -кольца и $(n, 2)$ -почтикольца, которые изоморфны $(n, 2)$ -кольцам и $(n, 2)$ -почтикольцам эндоморфизмов различных полугрупповых n -групп. Получены следующие основные результаты:

- 1) Построено $(n, 2)$ -кольцо, изоморфное $(n, 2)$ -кольцу эндоморфизмов бесконечной абелевой полугрупповых n -группы (теорема 3).
- 2) Построено $(n, 2)$ -почтикольцо, изоморфное $(n, 2)$ -почтикольцу эндоморфизмов бесконечной не абелевой полугрупповых n -группы (теорема 5).
- 3) Построено $(n, 2)$ -кольцо, изоморфное $(n, 2)$ -кольцу эндоморфизмов бесконечной циклической n -группы (следствие 3).
- 4) Построено $(n, 2)$ -почтикольцо, изоморфное $(n, 2)$ -почтикольцу эндоморфизмов конечной не абелевой полугрупповых n -группы (теорема 6).
- 5) Построено $(n, 2)$ -кольцо, изоморфное $(n, 2)$ -кольцу эндоморфизмов конечной абелевой полугрупповых n -группы (теорема 7).
- 6) Построено $(n, 2)$ -кольцо, изоморфное $(n, 2)$ -кольцу эндоморфизмов конечной циклической n -группы (следствие 9).

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиев И. Ш. О наименьшем многообразии симметрических алгебр // Алгебра и логика (семинар). 1966. Т. 5, №6. С. 5-14.
2. Чакани Б. Об абелевых свойствах примитивных классов универсальных алгебр // Acta scient. math. 1964. Vol. 25. P. 202-208.

3. Glazek K., Gleichgewicht B. Abelian n -groups // Proc. Congr. Math. Soc. J. Bolyai Esztergom (Hungary). 1977. Vol. 29. P. 321-329.
4. Курош А. Г. Общая алгебра. Лекции 1969-1970 уч. М.: Наука, 1974. 158 с.
5. Русаков С. А. Алгебраические n -арные системы. Минск: Навука і техника, 1992. 263 с.
6. Гальмак А. М. n -Арные группы. Часть 1. Гомель: Гомельский гос. университет им. Ф. Скорины, 2003. 195 с.
7. Гальмак А. М. n -Арные группы. Часть 2. Минск: Издательский центр БГУ, 2007. 323 с.
8. Crombez G. On (n,m) -rings // Abh. Math. Sem. Univ. 1972. Vol. 37. P. 180-199.
9. Post E. L. Polyadic groups // Trans. Amer. Math. Soc. 1940. Vol. 48. P. 208-350.
10. Глушкин Л. М. Позиционные оперативы // Мат. сборник. 1965. Т. 68 (110), № 3, С. 444-472.
11. Hosszu M. On the explicit form of n -group operations // Publ. Math. 1963. Vol. 10. P. 88-92.
12. Щучкин Н. А. Прямое произведение n -арных групп // Чебышевский сборник. 2014. Т. 15, Выпуск 2. С. 101-121.
13. Glazek K., Michalski J., Sierocki A. I. On evaluation of some polyadic groups // Contributions to General Algebra. 1985. Vol. 3. P. 159-171.
14. Khodabandeh H., Shahryari M. On the representations and automorphisms of polyadic groups // Commun. Algebra. 2012. Vol. 40. P. 2199-2212.
15. Щучкин Н. А. Полуциклические n -арные группы // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. 2009. Т. 3 (54). С. 186-194.

REFERENCES

1. Aliev, I. S. 1966, "On minimal varieties of symmetric algebras", Algebra and Logic (seminar). 5, №6. pp. 5-14. (In Russian)
2. Chakany, B. 1964, "Abelian properties of primitive classes of universal algebras", Acta Scient. Math., 25 : 3-4 (1964) pp. 202-208 (In Russian)
3. Glazek, K., Gleichgewicht, B. 1977, "Abelian n -groups", Proc. Congr. Math. Soc. J. Bolyai Esztergom (Hungary) 29 pp. 321-329.
4. Kurosh, A. G. 1974, "General algebra, Lectures 1969-1970", Nauka, Moscow, 158 pp. (In Russian)
5. Rusakov, S. F. 1992, "Algebraic n -ary systems", Navuka i technika, Minsk, 264 pp. (In Russian)
6. Gal'mak, A. M. 2003, " n -Ary groups", Part I, Gomel university, Gomel, 195 pp. (In Russian)
7. Gal'mak, A. M. 2007, " n -Ary groups", Part 2, Publishing center of BSU, Minsk, 325 pp. (In Russian)
8. Crombez, G. 1972, "On (n,m) -rings", Abh. Math. Sem. Univ. 37, pp. 180-199.
9. Post, E. L. 1940, "Polyadic groups", Trans. Amer. Math. Soc. 48, pp. 208-350.

10. Gluskin, L. M. 1965, "Positional operations", Math. collection, V.68 (110), No 3, pp. 444-472. (In Russian)
11. Hosszu, M. 1963, "On the explicit form of n -group operations", Publ. Math. 10, pp. 88-92.
12. Shchuchkin, N.A. 2014, "Direct product of n -ary groups", Chebyshev's collection 15, Issue 2, pp. 101-121. (In Russian)
13. Glazek, K., Michalski, J., Sierocki, A., I. 1985, "On evaluation of some polyadic groups", Contributions to General Algebra 3, Proc. Conf., Vienna. pp. 159-171.
14. Khodabandeh, H., Shahryari, M. 2012, "On the representations and automorphisms of polyadic groups", Commun. Algebra 40, pp. 2199-2212.
15. Shchuchkin, N.A. 2009, "Semicyclic n -ary groups", Izv. Gomel State Univ. 3(54), pp. 186-194. (In Russian)

Получено 12.11.2020 г.

Принято в печать 21.02.2021 г.